

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- El producto no debe ser transportado con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano o animales, ni forrajes
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Amonio cuaternario

- Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada, así como la ropa interior y zapatos. En caso de malestar: Solicitar atención médica. Mostrar al médico el envase, la etiqueta y/o la Hoja de Seguridad.

- Tras inhalación: Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.
- Tras contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y jabón. En caso de irritación, acudir al médico.
- Tras contacto con los ojos: Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.
- Tras ingestión: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda médica.

Indicaciones para el médico:
Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847

BASF Peruana S.A.: 513 2505

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos acequias, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



Pix®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Mepiquat chloride..... 50 g/L

Aditivos c.s.p. 1.0 L

Reg. N° 091-96-AG-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915 – Callao

Casilla 3911, Lima 100

Tel: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2519

D-BASF

We create chemistry

FORMULADO POR:

BASF Societas Europaea

67056 Ludwigshafen,

Alemania

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:


Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® = Marca Registrada BASF

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Pix®, pertenece al grupo de bioreguladores (inhibidores de síntesis del ácido giberélico), es absorbido por las hojas actuando sistemáticamente en toda la planta, tiene la función de interferir los procesos fisiológicos de las plantas con miras a un mayor aprovechamiento de su potencial genético.

En el cultivo de algodón reduce el crecimiento vegetativo ya que acorta los entrenudos y brotes laterales, con lo cual se obtiene una planta más compacta. Asimismo mejora la retención de cápsulas en las ramas inferiores lo que conduce a un mayor rendimiento. El follaje tratado se presenta verde oscuro, debido a un mayor contenido de clorofila en las hojas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

Cultivo	Dosis		PC* (días)	LMR** (ppm)
	L/Ha	ml/200 L		
Algodón	1.0 - 1.5	-	30	6.0
Papa	1.0 - 1.5	-	n.d.	0.05
Tomate	1.0 - 1.5	-	n.d.	0.05
Naranja	-	200	n.d.	0.05
Frijol	1.0	-	n.d.	0.05

* PC = Período de Carencia

n.d. = no determinado

Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

**LMR = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Efectuar buena cobertura en la aplicación.

- Algodón: Aplicar al botoneo inicio de floración (1 a 5 flores/10 m de surco) o con plantas de 70-80 cm. No aplicar en plantas estresadas o con escasez de agua.
- Papa: Aplicar a los 50 a 55 días de la siembra o al inicio de la tuberización.
- Tomate: Al inicio de floración.
- Naranja: En plena floración y cuajado.
- Frijol: Antes de la floración.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Pix® es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas y fertilizantes foliares debido a su formulación, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD: Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos indicados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"