

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc. No se debe comer, beber ni fumar durante la aplicación. Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas, con abundante agua y jabón. Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa. Manéjese en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugar fresco y seco alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. No contaminar las fuentes de agua. En cultivos alimenticios deberá suspenderse la aplicación de 3 - 21 días antes de la cosecha.

Causa irritación ocular.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta. Quite la ropa contaminada inmediatamente. Lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón. Lave los ojos contaminados con un chorro suave de agua pura por un lapso de 10 a 15 minutos. Mantenga al paciente animado, caliente, al aire fresco y en posición de descanso. Dé soporte respiratorio si se hace necesario. No induzca al vómito, si el paciente está inconsciente.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:

Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario, por medio de respiración controlada.

ANTIDOTO: Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.



**Scala®
40 SC**

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición Química:
Pyrimethanil,..... 400 g/L
Aditivos,..... c.s.p 1 L
Reg. N° 397-97-AG-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá DC
Colombia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro Lima - Perú
Telf. 211-3800

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**

**Contenido
Neto: 1 L**

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del Grupo Bayer

GENERALIDADES:

SCALA 40 SC es un fungicida del grupo anilino pirimidina, preventivo y curativo, que se transporta acropétalmente y tiene acción translaminar y un novedoso modo de acción que inhibe la secreción de enzimas del hongo que son necesarias para la infección, así evita y logra detener el proceso infeccioso del patógeno.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

USO ESPECIFICO:

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS (%) | DOSIS l/ha. | DOSIS ml/cil. 200 l | PC* (días) | LMR** (ppm) |
|------------|----------------------|-------------------------|-----------|-------------|---------------------|------------|-------------|
| | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | | | | | |
| AJO | Pudrición del cuello | <i>Botrytis all</i> | -- | -- | 200 | 3 | 2,00 |
| CITRICOS | Pudredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | -- | -- | 200 | 21 | 0,50 |
| GYPSOPHILA | Pudredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | -- | -- | 200 | 10 | 5,00 |
| FRESA | Botrytis | <i>Botrytis cinerea</i> | -- | -- | 200 | 7 | 2,00 |
| VID | Botrytis | <i>Botrytis cinerea</i> | -- | -- | 200 | 21 | 5,00 |
| TOMATE | Pudredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | -- | -- | 200 | 3 | 2,00 |
| PIMIENTO | Botrytis | <i>Botrytis cinerea</i> | -- | 0.5 | 200 | 3 | 2,00 |
| ALCACHOFA | Botrytis | <i>Botrytis cinerea</i> | -- | 0.5-0.6 | --- | 3 | 2,00 |
| PALTO | Botrytis | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.1-0.15 | 2 - 3 | --- | N/d | 0,05 |

*PC = Periodo de carencia (días) **LMR = Límite máximo de residuos (ppm)

FORMA DE EMPLEO:

Utilice de preferencia, gota fina en las aplicaciones. Llène con agua el tanque de la aspersora hasta la mitad, agregue la cantidad de producto recomendado agitando bien y complete luego esta mezcla con el resto de agua hasta obtener una solución estable y homogénea.

PERIODO DE REENTRADA: 24 horas

INCOMPATIBILIDAD:

No es compatible con productos que contengan aluminio (Phosetyl-Al) si es compatible con productos comunmente usados en agricultura, sin embargo se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar. No mezcle con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

