

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc. No se debe comer, beber ni fumar durante la aplicación. Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas, con abundante agua y jabón. Evítense el contacto con la piel, ojos y ropa. Manéjese en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugar fresco y seco alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. No contaminar las fuentes de agua. En cultivos alimenticios deberá suspenderse la aplicación de 3-21 días antes de la cosecha. Causa irritación ocular.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Anilino-pirimidinas

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela esta etiqueta. Quite la ropa contaminada inmediatamente. Lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón. Lave los ojos contaminados con un chorro suave de agua pura por un lapso de 10 a 15 minutos. Mantenga al paciente animado, caliente, al aire fresco y en posición de descanso. Dé soporte respiratorio si se hace necesario. No induzca al vómito, si el paciente está inconsciente.

**INDICACIONES PARA EL MEDICO:**

Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario, por medio de respiración controlada.

ANTIDOTO: Tratamiento sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:**

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROMQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.



**Scala®  
40 SC**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

Composición:  
Pyrimethanil,..... 400 g/L  
Aditivos,..... c.s.p 1 L

Reg. N°397-97-AG-SENASA

**Titular del Registro:**  
Bayer S.A.  
Paseo de la República 3074  
Piso 10. San Isidro.

**Formulado por:**  
Bayer S.A.  
Av. Américas 57-52  
Bogotá DC  
Colombia

**Importado y distribuido por:**  
Bayer S.A.  
Paseo de la República 3074  
San Isidro Lima - Perú  
Telf. 211-3800

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO  
NO INFLAMABLE**

**Contenido  
Neto: 1 L**

Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del Grupo Bayer

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

SCALA 40 SC es un fungicida del grupo anilino-pirimidina, preventivo y curativo, que se transporta acropétalmente y tiene acción translaminar y un novedoso modo de acción que inhibe la secreción de enzimas del hongo que son necesarias para la infección, así evita y logra detener el proceso infectivo del patógeno.

Utilice de preferencia, gota fina en las aplicaciones. Llene con agua el tanque de la aspersora hasta la mitad, agregue la cantidad de producto recomendado agitando bien y complete luego esta mezcla con el resto de agua hasta obtener una solución estable y homogénea.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (%)	DOSIS l/ha.	DOSIS ml/cil. 200 l	PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO					
AJO	Pudrición del cuello	<i>Botrytis alli</i>	--	--	200	3	2,00
CITRICOS	Pudredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	--	200	21	0,50
GYPSOPHILA	Pudredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	--	200	10	5,00
FRESA	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	--	200	7	2,00
VID	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	--	200	21	5,00
TOMATE	Pudredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	--	200	3	2,00
PIMIENTO	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	0.5	200	3	2,00
ALCACHOFA	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	0.5-0.6	---	3	2,00
PALTO	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	0.1-0.15	2 - 3	---	N/d	0,05

\*PC = Periodo de carencia (días) \*\*LMR = Límite máximo de residuos (ppm)

**COMPATIBILIDAD:**

No es compatible con productos que contengan aluminio (Phosetyl-AI) si es compatible con productos comunmente usados en agricultura, sin embargo se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar. No mezcle con productos alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:**

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

**PERIODO DE REINGRESO:**

12 horas

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

