

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Total 28.9 cm.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Su ingestión presenta síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- TÉLFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000.**
- CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

Fordazim[®] 5 Fw

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Carbendazim..... 500 g/L
Aditivos..... csp 1L

Reg. N°: 323-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Agro Klinge S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306, Santiago de Surco,
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulador:
Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing
Street, Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FORDAZIM 5 Fw es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, que controla una gama de hongos que afectan a cultivos de hortalizas, frutales y plantas ornamentales. También se utiliza para el tratamiento post-cosecha en cultivos hortícolas y frutícolas. FORDAZIM 5 Fw se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua utilizándose cualquier equipo de aspersión terrestre.

**AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/200L		
NARANJO	"Podredumbre gris" "Podredumbre verde"	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Penicillium digitatum</i>	-	200 - 300 100	7	10
VID	"Podredumbre gris" "Oidium"	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Uncinula necator</i>	-	200 - 300 200 - 300	7	4
MANZANO	"Oidium"	<i>Podosphaera leucotricha</i>	-	200 - 300	7	3
MELOCOTONERO	"Oidium" "Monilia"	<i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Monilia fruticola</i>	-	200 - 300	7	2
ORNAMENTALES	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 0.6	250 - 300	7	N.D.
TOMATE	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6 - 1.0	300 - 400	7	0.5
PÁPRIKA	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6 - 0.8	300 - 400	7	5
ALCACHOFA	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	300 - 400	7	3
PALTO	"Muerte descendente"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	100 - 300	14	3
ARROZ	"Quemado del arroz"	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	250 - 300	7	2

P.C.: Período de carencia / L.M.R.: Límite máximo de residuos / N.D.: No Determinado
VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 – 600 L/ha.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones a la aparición de la enfermedad. Repetir cada 10 a 15 días o cuando se observe una reinfestación.
"Podredumbre gris" o "Botritis" en naranjo, vid y manzano: Aplicar al inicio, mitad y final de la floración. **"Podredumbre Verde" en naranjo:** Hacer una inmersión de los frutos por tres minutos, inmediatamente después de la cosecha. **"Oidium" en vid, manzano, melocotonero:** Empezar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 10 a 14 días.
NÚMERO DE APLICACIONES: 3 aplicaciones por campaña.
PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Incompatible con aceites y productos de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm