"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Su ingestión presenta síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, nauseas, vómitos, diarrea, etc. Induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **NOTA AL MEDICO:** El tratamiento será sintomático. No existe ANTIDOTO específico.
- En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX, Telf.: 0–800–1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental)- Atención 24 horas.

Atención al cliente:TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.: Telf. 01-348-1103

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por la autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Moderadamente Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada por TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.

Fordazim® 5 Fw

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICION QUIMICA (20ºC):

Carbendazim ..... 500 g/L

Aditivos .....csp 1L

Reg. Nº: 323-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

Tecnología Química y Comercio S.A.

Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.Telf.: 348-1103, Fax: 348-1020 RUC N°: 20307150981

Fabricado y Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd
6TH Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750#,
Jinan, Shandong,China

Contenido Neto: 1 L

Lote Nº :
F. de Formulación :
F. de Vencimiento :

NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FORDAZIM 5 Fw es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, que controla los hongos que afectan a cultivos de hortalizas, frutales y plantas ornamentales indicadas en el cuadro de uso. También se utiliza para el tratamiento post-cosecha en cultivos hortícolas y frutícolas. **FORDAZIM 5 Fw** se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua utilizándose cualquier equipo de aspersión terrestre.

"AGITESE BIEN ANTES DE USAR"

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

USO ESPECIFICO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L/ha	ml/cil 200 L	(días)	(ppm)
NARANJO	"Podredumbre gris" "Podredumbre verde"	Botrytis cinerea Penicillium digitatum	—	200-300 100	7	10
VID	"Podredumbre gris" "Oidium"	Botrytis cinerea Uncinula necator	—	200-300 200-300	7	4
MANZANO	"Oidium"	Podosphaera leucotricha	—	200-300	7	3
MELOCOTONERO	"Oidium" "Monilia"	Sphaerotheca pannosa Monilia fruticola	—	200-300	7	2
ORNAMENTALES	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0,5 - 0,6	250-300	7	ND
TOMATE	"Podredumbre gris "	Botrytis cinerea	0,6 - 1,0	300 400	7	0,5
PAPRIKA	"Pudrición gris"	Botrytis cinerea	0,6 - 0,8	300-400	7	5
ALCACHOFA	"Pudrición gris"	Botrytis cinerea	—	300-400	7	3
PALTO	"Muerte descendente"	Lasiodiplodia theobromae	—	100-300	14	3

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos / N.D.= No Determinado

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 - 600 L/ha.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones a la aparición de la enfermedad. Repetir cada 10 a 15 días o cuando se observe una reinfestación. **"Podredumbre gris" o "Botritis" en naranjo, vid y manzano:** Aplicar al inicio, mitad o final de la floración. **"Podredumbre Verde" en naranjo:** Hacer una inmersión de los frutos por tres minutos, inmediatamente después de la cosecha. **"Oidium" en vid, manzano y melocotonero:** Empezar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 10 a 14 días.

NÚMERO DE APLICACIONES: 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con aceites y productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO