

Longitud Total 28.9 cm.

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- \*No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- \*Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- \*Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- \*No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- \*Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- \*Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- \*Grupo químico: Benzimidazoles
- \*En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- \*Su ingestión presenta síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- \*En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- \*No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**\*NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento será sintomático. No existe ANTIDOTO \*específico.

\*En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX, Telf.: 0-800-1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental)-Atención 24 horas.

Atención al cliente: **Tecnología Química y Comercio S.A.:** Telf. 01-348-1103

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- \*Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- \*Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por la autoridades locales para este fin
- \*Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- \*Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- \*Moderadamente Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- \*No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- \*En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# Fordazim<sup>®</sup> 5 Fw

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - SC

**COMPOSICIÓN QUÍMICA (20°C):**

Carbendazim..... 500 g/L  
Aditivos..... csp 1L

Reg. Nº: 323-96-AG-SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12,  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.  
Lima - Perú. Telf.: 348-1103, Fax: 348-1020  
RUC Nº: 20307150981

Fabricado y Formulado por:  
**Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.**  
Room 10-6, Shidai Square,  
Nº 8, Lengjing Street, Ningbo 315010, Zhejiang,  
China.

Lote Nº:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

© Marca Registrada por Tecnología Química y Comercio S.A.

Producto Peruano



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** FORDAZIM 5 Fw es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, que controla los hongos que afectan a cultivos de hortalizas, frutales y plantas ornamentales indicadas en el cuadro de uso. También se utiliza para el tratamiento post-cosecha en cultivos hortícolas y frutícolas. FORDAZIM 5 Fw se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua utilizándose cualquier equipo de aspersión terrestre.

“AGITASE BIEN ANTES DE USAR”  
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**USO ESPECIFICO Y DOSIS:**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L/ha	ml/cil 200 L		
NARANJO	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	—	200-300 100	7	10
	"Podredumbre verde"	<i>Penicillium digitatum</i>				
VID	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	—	200-300 200-300	7	4
	"Oidium"	<i>Uncinula necator</i>				
MANZANO	"Oidium"	<i>Podosphaera leucotricha</i>	—	200-300	7	3
MELOCOTONERO	"Oidium"	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	—	200-300	7	2
	"Monilia"	<i>Monilia fruticola</i>				
ORNAMENTALES	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,5 - 0,6	250-300	7	ND
TOMATE	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,6 - 1,0	300 400	7	0,5
PAPRIKA	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0,6 - 0,8	300-400	7	5
ALCACHOFA	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	—	300-400	7	3
PALTO	"Muerte descendente"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	—	100-300	14	3

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos / N.D.= No Determinado  
**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 400 - 600 L/ha.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar las aplicaciones a la aparición de la enfermedad. Repetir cada 10 a 15 días o cuando se observe una reinfestación. "Podredumbre gris" o "Botritis" en naranjo, vid y manzano: Aplicar al inicio, mitad o final de la floración. "Podredumbre Verde" en naranjo: Hacer una inmersión de los frutos por tres minutos, inmediatamente después de la cosecha. "Oidium" en vid, manzano y melocotonero: Empezar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 10 a 14 días.

**NÚMERO DE APLICACIONES:** 2 aplicaciones por campaña.  
**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con aceites y productos de reacción alcalina.  
**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.  
**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

14 cm