

14 cm

Longitud Total 28.9 cm.

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Su ingestión presenta síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- NOTA AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTIDOTO específico.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a CICOTOX, Telf.: 0-800-1-3040 (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental)-Atención 24 horas.
- Atención al cliente: **Tecnología Química y Comercio S.A.**: Telf. 01-348-1103
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por la autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Moderadamente Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



© Marca Registrada por Tecnología Química y Comercio S.A.

Fordazim[®]
5 Fw

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Carbendazim..... 500 g/L
Aditivos..... csp 1L

Reg. N°: 323-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú. Telf.: 348-1103, Fax: 348-1020
RUC N°: 20307150981

Fabricado y Formulado por:
Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation
N° .37, Qing Chun Road, Hangzhou, Zhejiang, China

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FORDAZIM 5 Fw es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, que controla los hongos que afectan a cultivos de hortalizas, frutales y plantas ornamentales indicadas en el cuadro de uso. También se utiliza para el tratamiento post-cosecha en cultivos hortícolas y frutícolas. FORDAZIM 5 Fw se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua utilizándose cualquier equipo de aspersión terrestre.

“AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/cil 200 L		
NARANJO	"Podredumbre gris" "Podredumbre verde"	Botrytis cinerea Penicillium digitatum	—	200-300 100	7	10
VID	"Podredumbre gris" "Oidium"	Botrytis cinerea Uncinula necator	—	200-300 200-300	7	4
MANZANO	"Oidium"	Podosphaera leucotricha	—	200-300	7	3
MELOCOTONERO	"Oidium" "Monilia"	Sphaerotheca pannosa Monilia fruticola	—	200-300	7	2
ORNAMENTALES	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0,5 - 0,6	250-300	7	ND
TOMATE	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0,6 - 1,0	300 400	7	0,5
PÁPRIKA	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0,6 - 0,8	300-400	7	5
ALCACHOFA	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	—	300-400	7	3
PALTO	"Muerte descendente"	Lasiodiplodia theobromae	—	100-300	14	3

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos / N.D.= No Determinado
VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 - 600 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones a la aparición de la enfermedad. Repetir cada 10 a 15 días o cuando se observe una reinfestación. "Podredumbre gris" o "Botrytis" en naranjo, vid y manzano: Aplicar al inicio, mitad o final de la floración. "Podredumbre Verde" en naranjo: Hacer una inmersión de los frutos por tres minutos, inmediatamente después de la cosecha. "Oidium" en vid, manzano y melocotonero: Empezar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 10 a 14 días.

NÚMERO DE APLICACIONES: 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con aceites y productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm