

14 cm

Longitud Total 28.9 cm.

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Su ingestión presenta síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**·NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento será sintomático. No existe ANTIDOTO específico.

·En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX**, Telf.: **0-800-1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental)-Atención 24 horas.

Atención al cliente: **Tecnología Química y Comercio S.A.**: Telf. 01-612-6565

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por la autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Moderadamente Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada por Tecnología Química y Comercio S.A.

**Fordazim<sup>®</sup>**  
**5 Fw**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - SC**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA (20°C):**

Carbendazim..... 500 g/L  
Aditivos..... csp 1L

Reg. N°: 323-96-AG-SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12,  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.  
Lima - Perú. Telf.: 612-6565 Fax: 348-1020  
RUC N°: 20307150981

Fabricado y Formulado por:  
**Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd**  
6TH Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750#,  
Jinan, Shandong, China

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

Producto Peruano

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** FORDAZIM 5 Fw es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, que controla los hongos que afectan a cultivos de hortalizas, frutales y plantas ornamentales indicadas en el cuadro de uso. También se utiliza para el tratamiento post-cosecha en cultivos hortícolas y frutícolas. FORDAZIM 5 Fw se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua utilizándose cualquier equipo de aspersión terrestre.

“AGITESE BIEN ANTES DE USAR”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**USO ESPECÍFICO Y DOSIS:**

| CULTIVO      | ENFERMEDAD                                |                                                         | DOSIS     |                    | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|
|              | NOMBRE COMUN                              | NOMBRE CIENTIFICO                                       | L/ha      | ml/cil<br>200 L    |                |                 |
| NARANJO      | "Podredumbre gris"<br>"Podredumbre verde" | <i>Botrytis cinerea</i><br><i>Penicillium digitatum</i> | —         | 200-300<br>100     | 7              | 10              |
| VID          | "Podredumbre gris"<br>"Oidium"            | <i>Botrytis cinerea</i><br><i>Uncinula necator</i>      | —         | 200-300<br>200-300 | 7              | 4               |
| MANZANO      | "Oidium"                                  | <i>Podosphaera leucotricha</i>                          | —         | 200-300            | 7              | 3               |
| MELOCOTONERO | "Oidium"<br>"Monilia"                     | <i>Sphaerotheca pannosa</i><br><i>Monilia fruticola</i> | —         | 200-300            | 7              | 2               |
| ORNAMENTALES | "Podredumbre gris"                        | <i>Botrytis cinerea</i>                                 | 0,5 - 0,6 | 250-300            | 7              | ND              |
| TOMATE       | "Podredumbre gris"                        | <i>Botrytis cinerea</i>                                 | 0,6 - 1,0 | 300 400            | 7              | 0,5             |
| PAPRIKA      | "Podredumbre gris"                        | <i>Botrytis cinerea</i>                                 | 0,6 - 0,8 | 300-400            | 7              | 5               |
| ALCACHOFA    | "Podredumbre gris"                        | <i>Botrytis cinerea</i>                                 | —         | 300-400            | 7              | 3               |
| PALTO        | "Muerde descendente"                      | <i>Lasiodiplodia theobromae</i>                         | —         | 100-300            | 14             | 3               |
| ARROZ        | "Quemado de arroz"                        | <i>Pyricularia oryzae</i>                               | —         | 250-300            | 7              | 2               |

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos / N.D.= No Determinado

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 400 - 600 L/ha.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar las aplicaciones a la aparición de la enfermedad. Repetir cada 10 a 15 días o cuando se observe una reinfestación. "Podredumbre gris" o "Botritis" en naranjo, vid y manzano: Aplicar al inicio, mitad o final de la floración. "Podredumbre Verde" en naranjo: Hacer una inmersión de los frutos por tres minutos, inmediatamente después de la cosecha. "Oidium" en vid, manzano y melocotonero: Empezar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 10 a 14 días.

**NÚMERO DE APLICACIONES:** 2 aplicaciones por campaña.

**PERÍODO DE REINGRESO:** 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con aceites y productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm