Longitud Total 28.9 cm.

14 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Su ingestión presenta síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, nauseas, vómitos, diarrea, etc. Induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento será sintomático. No existe ANTIDOTO específico.
- En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX, Telf.: 0–800–1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental)- Atención 24 horas.

Atención al cliente: ***Tecnología Química y Comercio S.A.***: Telf. 01-612-6565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por la autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Moderadamente Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada por *Tecnología Química y Comercio S.A.*

Fordazim® 5 Fw

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA (20°C):
Carbendazim..... 500 g/L
Aditivos..... csp 1L

Reg. Nº: 323-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.Telf.: 612-6565 Fax: 348-1020
RUC N°: 20307150981

Fabricado y Formulado por:
Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation
N° .37, Qing Chun Road, Hangzhou, Zhejiang, China

Lote Nº:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FORDAZIM 5 Fw es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, que controla los hongos que afectan a cultivos de hortalizas, frutales y plantas ornamentales indicadas en el cuadro de uso. También se utiliza para el tratamiento post-cosecha en cultivos hortícolas y frutícolas. **FORDAZIM 5 Fw** se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua utilizándose cualquier equipo de aspersión terrestre.

"AGITESE BIEN ANTES DE USAR"
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECIFICO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L/ha	ml/cil 200 L	(días)	(ppm)
NARANJO	"Podredumbre gris" "Podredumbre verde"	*Botrytis cinerea* *Penicillium digitatum*	—	200-300 100	7	10
VID	"Podredumbre gris" "Oidium"	*Botrytis cinerea* *Uncinula necator*	—	200-300 200-300	7	4
MANZANO	"Oidium"	*Podosphaera leucotricha*	—	200-300	7	3
MELOCOTONERO	"Oidium" "Monilia"	*Sphaerotheca pannosa* *Monilia fruticola*	—	200-300	7	2
ORNAMENTALES	"Podredumbre gris"	*Botrytis cinerea*	0,5 - 0,6	250-300	7	ND
TOMATE	"Podredumbre gris "	*Botrytis cinerea*	0,6 - 1,0	300 400	7	0,5
PAPRIKA	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	0,6 - 0,8	300-400	7	5
ALCACHOFA	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	—	300-400	7	3
PALTO	"Muerte descendente"	*Lasiodiplodia theobromae*	—	100-300	14	3
ARROZ	"Quemado de arroz"	*Pyricularia oryzae*	—	250-300	7	2

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos / N.D.= No Determinado

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 - 600 L/ha.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones a la aparición de la enfermedad. Repetir cada 10 a 15 días o cuando se observe una reinfestación. "Podredumbre gris" o "Botritis" en naranjo, vid y manzano: Aplicar al inicio, mitad o final de la floración. "Podredumbre Verde" en naranjo: Hacer una inmersión de los frutos por tres minutos, inmediatamente después de la cosecha. "Oidium" en vid, manzano y melocotonero: Empezar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 10 a 14 días.
NÚMERO DE APLICACIONES: 2 aplicaciones por campaña.
PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.
COMPATIBILIDAD: Incompatible con aceites y productos de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

Producto Peruano

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

09 cm

Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.