

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Total 28.9 cm.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 .No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 .Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 .Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 .No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 .Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 .Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 .Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:
 .Grupo químico: Benzimidazoles
 .En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
 .Su ingestión presenta síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
 .En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 .No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
 .Nota al médico: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
 .Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op. 4, TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
 .Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
 .Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 .Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
 .Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
 .Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 .No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 .En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Fordazim[®] 5 Fw

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
 Carbendazim..... 500 g/L
 Aditivos..... csp 1L

Reg. N°: 323-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A
 Calle René Descartes 311
 Urb. Santa Raquel-2da. Etapa. Ate. Lima-Perú.
 Telf.: 612-6565 - RUC N° 20508704217

Formulado por:
 Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
 Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing
 Street, Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
 F. de Formulación:
 F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y DE MANEJO: FORDAZIM 5 Fw es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, que controla una gama de hongos que afectan a cultivos de hortalizas, frutales y plantas ornamentales. También se utiliza para el tratamiento post-cosecha en cultivos hortícolas y frutícolas. FORDAZIM 5 Fw se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua utilizándose cualquier equipo de aspersión terrestre.

"AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR"

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	P.C. m/cil 200 L (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
NARANJO	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	—	200-300 100	7 10
	"Podredumbre verde"	<i>Penicillium digitatum</i>			
VID	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	—	200-300 200-300	7 4
	"Oidium"	<i>Uncinula necator</i>			
MANZANO	"Oidium"	<i>Podosphaera leucotricha</i>	—	200-300	7 3
MELOCOTONERO	"Oidium"	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	—	200-300	7 2
	"Monilia"	<i>Monilia fruticola</i>			
ORNAMENTALES	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 0.6	250-300	7 ND
TOMATE	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6 - 1.0	300-400	7 0.5
PAPRIKA	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6 - 0.8	300-400	7 5
ALCACHOFA	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	—	300-400	7 3
PALTO	"Muerte descendente"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	—	100-300	14 3
ARROZ	"Quemado de arroz"	<i>Pyricularia oryzae</i>	—	250-300	7 2

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos / N.D.= No Determinado
 VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 - 600 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones a la aparición de la enfermedad. Repetir cada 10 a 15 días o cuando se observe una reinfestación.

"Podredumbre gris" o "Botritis" en naranjo, vid y manzano: Aplicar al inicio, mitad y final de la floración. "Podredumbre Verde" en naranjo: Hacer una inmersión de los frutos por tres minutos, inmediatamente después de la cosecha. "Oidium" en vid, manzano, melocotonero: Empezar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos de 10 a 14 días.

NÚMERO DE APLICACIONES: 3 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con aceites y productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

UJ: 090419 V2



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

05