"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores. Evitar el contacto con la piel e inhalar al momento de la aplicación. Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación. No comer ni fumar durante la aplicación luego lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa. No aplicar en dirección contraria al viento.
No verter los restos del caldo de aspersión sobre vegetación útil y fuentes de agua (lagos, rios, estanques acequias). Usarlo en sus envases originales y almacenarlo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados a temperaturas menores de 40°C para que el producto no sea afectado en su composición. Transportarlo y almacenarlo en sus envases originales debidamente etiquetados y bien cerrados.
Mantenerlo lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
No almacenar ni transportar junto con productos alimenticios, bebidas, forrajes y medicinas.

PRIMEROS AUXILIOS:
Si es ingerido por accidente, dar de beber dos (2) vasos con agua. No inducir el vómito ni dar de beber si la persona está inconsciente. Acudir de inmediato al médico, entre tanto hacer reposar al paciente en un ambiente fresco, no desabrigarlo.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos. Si es inhalado mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Si hay contacto del producto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:

Se sugiere lavado gástrico.

ANTÍDOTO:

No existe un antídoto específico. El tratamiento consiste en lavado gástrico y administración de abundantes líquidos por vía oral. Vigilar la respiración y dar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
No vierta el sobrante del caldo de aspersión sobre vegetación no objeto de control ni en fuentes de agua. No lave los equipos de aplicación en lagos, rios, arroyos o estanques.
Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

BAYER

Intrepid® 2F

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada SC

Methoxylenozide, 248 g/L
Aditivos, csp 1 litro

Reg.Min.Agric: N° 968-2000-AG-SENASA

Titular del Registro:
Dow Perú S.A.
Arias Aragüez 250
Lima 18. Tel. 2084700

Formulado por:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Apartado Aéreo 53895
Santafé de Bogotá
Colombia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima - Perú
Telf. 2113800

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

Contenido Neto:

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada de Dow AgroSciences

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Intrepid 2F es un insecticida del grupo de las benzoilhidracinas, con acción estomacal que produce en las larvas del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y barrenador de brotes (Heliothis virescens) severas distorsiones en el proceso de muda. Intrepid 2F imita las hormonas naturales de la muda de los insectos entonces la larva tratada inicia una muda prematura y deja de alimentarse dentro de las siguientes 24 horas y al no poder desprenderse de la vieja cutícula muere por deshidratación y hambre entre las 48 a 72 horas. Se aplica en pulverizaciones previa agua. Es recomendable preparar previamente una mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente y luego agregar el resto del agua al tanque.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L / ha	%	ml /cil.		
Maíz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.25	0.0625	125	1	N/d
Espárrago	Barrenador de brotes	Heliothis virescens	0.3 - 0.4	0.075-0.1	150-200	N/d	N/d
		Copitarsia decolora	0.4	---	---	N/d	N/d
Vid	Comedor de hojas	Pholus vitis	—	0.03-0.05	60-100	30	1.0
Pimiento	Barrenador de brotes	Heliothis virescens	0.5	0.1	200	1	1.0
	Gusano perforador	Symmetrischema capsicum	0.6	0.12	—		1.0
Arveja Holantao	Barrenador de brotes	Heliothis virescens	0.4-0.5	0.1-0.125	200-250	N/d	0.2
Palto	Bicho del cesto	Oiketicus kirbyi	—	0.035-0.05	—	4	0.7

Iniciar las aplicaciones cuando las plantas tengan aproximadamente 15 cm de altura y se encuentren larvas de estadios L1 y L2.

PC* = Periodo de carencia LMR** = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomiendan tres aplicaciones por campaña. En el caso de pimiento se aplica desde el inicio de floración o cuajado de fruto.

COMPATIBILIDAD:
Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes. No mezclar con productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD:
Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las instrucciones de uso.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

- Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone 293 C, Pantone 368 C y Pantone 286 C