

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a 0 °C ó superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; ingresar al área tratada después que se seque la nube de aspersión (24 horas).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Puede ser mortal si se ingiere. Evitar la ingestión del producto.
- Puede producir irritación a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel.
- Evitar la inhalación de vapores. No inhalar la nube de aspersión.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroides
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847.
- Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos
- **NOTA AL MEDICO**
- Grupo químico: Piretroides
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir el vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- No disponer con residuos municipales.
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobranes del producto o envases vacíos.
- Mantener una banda de no aplicación de 3 metros hacia fuentes de agua.
- Tóxico para abejas.
- Tóxico para el ganado. No permitir el ingreso de animales en el área tratada
- En caso de derrame colocar sobre el producto un material absorbente como aserrín o arena, recogerlo y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Karate

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

Composición

Lambda cyhalothrin 50.0 g/L
 Aditivos c.s.p. 1L

Número de Registro: 673-98-AG-SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú
 Av. Manuel Olguin 335 Of. 808, Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima, Perú
 RUC: 20501511740

Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:

TQC TECNOLOGÍA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
 Calle René Descartes No 311
 Urb. Santa Raquel Zda Etapa, Ate.
 Lima - Perú.
 Telf: 612-6565, Fax: 348-1020

Formulado por:

Syngenta Crop Protection AG
 Colombia

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



Los nombres de producto que contienen ® o ™, el logo SYNGENTA y el marco CP FRAMA son marcas comerciales de Syngenta Crop Protection del Grupo Syngenta

Contenido neto:
1 Litro



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Para la preparación, echar la cantidad de Karate a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale al último y vuelva a agitar.
- Karate puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas de preferencia del tipo cono vacío).

CUADRO DE USOS
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (cc/200L de agua)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	150-200	11	< 0.01
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>		ND	ND
Tomate	Polilla	<i>Scrobipalpus absoluta</i>		1	0.01
Col	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp.</i>		3	<0.01
	Gusano de la hoja	<i>Plutella spp.</i>			
Garbanzo	Gusano salvador	<i>Heliothis virescens</i>		ND	ND
Frijol/ají	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp.</i>		ND	ND
Zapallo	Barrenador de frutos	<i>Diaphania hyalinata</i>		ND	ND
Papa	Epitrix	<i>Epitrix yanazara</i>	100-150	ND	ND
	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes sp.</i>			

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm) ND: No Determinado

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Karate debe ser aplicado tan pronto como se observen los primeros insectos de las plagas a controlar.
- Repetir la aplicación a intervalos de 8-10 días de acuerdo a la reinfestación o a la presión de la plaga
- Para el control de Cogollero en Maíz, aplicar tan pronto se observen los primeros daños (raspaduras o ventanitas) en las plantas.
- Para el control de Gorgojo de los Andes en papa, realizar tres aplicaciones con karate, dirigidas al cuello de la planta. La primera al brotamiento del cultivo; la segunda quince días después y la tercera quince días después, pero antes de realizar el aporque.
- Para evitar la aparición de resistencia, utilizar Karate en rotación con insecticidas de modo de acción diferente.

PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas.

COMPATIBILIDAD

- Karate es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes foliares comúnmente utilizados; sin embargo, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

- Karate, a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO