

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS"

Rescate® SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid 200 g/kg
Aditivos c.s.p 1kg

Reg. N°373-97-AG-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: SUMMIT AGRO
SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU
Calle Coronel Andrés Reyes 360 Of. 401-A San
Isidro. Lima – Perú. Teléf.: (511) 444-3096



FORMULADO POR: NIPPON SODA CO. Ltd
2-1 Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda ku, TOKIO
100 – 8165 Japón

IMPORTADO POR: BASF Peruana S.A.
Av. Oscar R. Benavides N° 5915 Callao 1 –
Casilla Postal N° 3911, Lima 100 Teléf.: (01) 513
2500 – Fax: (01) 513 2519



DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9
Magdalena del Mar Lima - Perú
Teléf.: (01)501-1000



Contenido Neto: 500 g

N° de Lote

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA
ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
DE USO Y APLICACIÓN

- No coma, no beba, ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene, ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS
AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Indicaciones para el médico: Trátese sintomáticamente
- Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106

CISPROQUIM (línea
gratuita): 0 800 50 847
BASF Peruana S.A.: 513 2505
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-
4837, Línea directa: 956740869

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RESCATE®SP es un insecticida que pertenece al nuevo grupo químico de los neonicotinoide
RESCATE®SP posee una alta acción sistémica, que actúa por contacto e ingestión, afectando el receptor acetil Colina Nicotínico de la membrana post sináptica en el sistema nervioso central de los insectos.

RESCATE®SP tiene como ingrediente activo al acetamiprid que es una molécula extremadamente activa, que requiere de dosis muy bajas por hectárea para controlar insectos picadores - chupadores y masticadores, lo que le confiere un amplio espectro de acción. **Grupo IRAC 4.**
Ponga el insecticida RESCATE®SP en agua limpia y luego mézclelo hasta que quede completamente diluido, no se debe almacenar el preparado de un día para otro.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/ha	g/Cilindro 200 L		
Algodón	Pulgones	<i>Aphis gossypii</i>	100 - 150	100	7	0.7*
		<i>Macrosiphum euphorbiae</i>				
	Trips	<i>Frankliniella gemina</i>	100 - 150	100		
		<i>Caliothrips brasiliensis</i>				
Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	150 - 200	150			
Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	50 - 200	150			
Limón	Minador de hojas	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.05 - 0.10%	100 - 200	14	1
Mandarina	Queresa coma	<i>Leptodermes beckii</i>	0.05 - 0.10%	100 - 200	14	1
	Queresa redonda	<i>Selenaspidus articulatus</i>				
Palto	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	500	100	15	0.5
Paprika	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	300 - 450	150 - 225	ND	0.3
Pimiento	Mosca Blanca	<i>Bemisia argentifolii</i>	200 - 300	100	3	0.3
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	200 - 300	100 - 150	14	0.1
	Mosca Blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>				

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos * LMR para semilla de algodón
ND: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando se inicien las primeras infestaciones de los insectos plagas, tratando de lograr una buena cobertura.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: RESCATE®SP es compatible con la mayoría de los productos utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que desee mezclar.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LEA CUIDADOSAMENTE LA
ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y
DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y
ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilice la funda o bolsa con la bolsa. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL
AMBIENTE

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.
- Peligroso para los peces: No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los envases vacíos.

