

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

Rescate® SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid 200 g/kg

Aditivos c.s.p 1kg

Reg.N°373-97-AG-SENASA

Titular del Registro: SUMMIT AGRO
SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL
PERU Av. José Pardo 513 Of. 701
Miraflores, Lima – Perú. Telf.: (511) 444-
3096



Formulado por: NIPPON SODA CO. Ltd
2-1 Ohnemachi 2-Chome, Chiyoda ku,
TOKIO 100 – 8165 Japón

Importado y Distribuido por: BASF
Peruana S.A.
Av. Oscar R. Benavides N° 5915 Callao 1 –
Casilla Postal N° 3911, Lima 100 Telf.: (01)
513 2500 – Fax: (01) 513 2519



We create chemistry

Contenido Neto 100 g

N° de Lote

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No coma, no beba, ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene, ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Indicaciones para el médico: Trátese sintomáticamente.
- Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

BASF Peruana S.A.: 513 2505

CISPROQUIM: 080050847 (línea gratuita)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RESCATE SP es un insecticida que pertenece al nuevo grupo químico de los neonicotinoides. RESCATE SP posee una alta acción sistémica, que actúa por contacto e ingestión, afectando el receptor acetil Colina Nicotínico de la membrana post sináptica en el sistema nervioso central de los insectos. RESCATE SP tiene como ingrediente activo al acetamiprid, que es una molécula extremadamente activa, que requiere de dosis muy bajas por hectárea para controlar insectos picadores - chupadores y mastigadores, lo que le confiere un amplio espectro de acción. Código IPAC 4.

Por la alta toxicidad RESCATE SP en agua limpia y luego mezclelo hasta que quede completamente diluido, no se debe almacenar el preparado de un día para otro.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS			DOSIS		**LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	g/ha	g/Cilindro 200 L	P.C. (días)	
Algodón	Pulgones	<i>Aphis gossypii</i>	100 - 150	100	7	ND
		<i>Macrosiphum euphorbiae</i>				
	Trips	<i>Frankliniella gemina</i>	100 - 150	100		
		<i>Caliothrips brasiliensis</i>				
Limón	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	150 - 200	150	14	1
		<i>Dysdercus peruvianus</i>	150 - 200	150		
	Arrebiatado	<i>Phyllobistis citrella</i>	0.05 - 0.10%	100 - 200		
		<i>Lepidosaphes leekii</i>	0.05 - 0.10%	100 - 200		
Mandarina	Queresa redonda	<i>Selenaspis articulatus</i>	500	100	15	0.5
		<i>Flortia floritiae</i>	300 - 450	150 - 225		
	Paprika	<i>Prodiptosis longifolia</i>	200 - 300	100		
		<i>Prodiptosis longifolia</i>	200 - 300	100		
Pimiento	Mosca Blanca	<i>Bemisia argentifolii</i>	200 - 300	100	3	0.3
		<i>Prodiptosis longifolia</i>	200 - 300	100		
	Tomate	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	200 - 300	100 - 150		

LMR.: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carencia ND.: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando se inicien las primeras infestaciones de los insectos plagas, tratando de lograr una buena cobertura.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: RESCATE SP es compatible con la mayoría de los productos utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que desee mezclar.

FITOTOXICIDAD: RESCATE SP no presenta fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS EN ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reduzca los envases, destrúyalos.
- Peligroso para los peces: No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los envases vacíos.

