

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Evitar la ingestión del producto, inhalar sus vapores o aspirar la neblina de aspersión.
- Puede producir irritación a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -5 °C o superiores a 35 °C.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Benzoylureas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- Mientras llega el médico, retire al paciente de la zona de peligro y llévalo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado diluido en agua.
- No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- Teléfonos de emergencia: SAMU: 106; Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú (01) 434-5600; CISPROQUIM: 080050847.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase del triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vados.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



**SORBA® 50 EC**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**Concentrado Emulsionable (EC)**

**Composición**

Lufenuron ..... 50 g/l  
Aditivos ..... c.s.p. 1 litro

**Reg. N° 645-98-AG-SENASA**

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú  
Av. Manuel Olguín 335, Of. 808.  
Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima. Perú  
RUC: 20501511740

**Importado y Distribuido por:**

**FARMAGRO**   
Av. Principal 2, Mz CS (Lote 3B, 4 y 5)  
Z.I. Huachipa Este  
San Antonio - Huarochiri, Lima  
Central: (01) 6141500

**Formulado por:**  
Syngenta S.A.  
Vía a Mamonal, Km. 6  
Cartagena, Colombia



**NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

**N° de Lote :**

**Fecha de Form.:**

**Fecha de Venc.:**

**CONTENIDO NETO**

**1 Litro**

**syngenta®**

Los nombres de productos que contienen el símbolo de fuego son propiedad de una compañía de Syngenta Crop Protection S.A.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- Para obtener un control óptimo y económico **SORBA® 50 EC** debe ser aplicado tan pronto como se observen los primeros estadios larvales de las plagas ya que es el momento en que estas son mas susceptibles. Repetir las aplicaciones a intervalos de 8 - 10 días de acuerdo a la reinfestación o a la presión de la plaga.
- Se recomienda aplicar **SORBA® 50 EC** con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de la planta, sobre todo en las zonas donde se encuentran comiendo las larvas de las plagas a controlar. De acuerdo a la experiencia práctica se recomienda emplear entre 200 a 400 litros de caldo insecticida por hectárea con plantas chicas y 600 litros de caldo insecticida por hectárea como mínimo con plantas desarrolladas.
- **SORBA® 50 EC** puede ser aplicado con pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).
- **SORBA® 50 EC** es fácil de preparar y puede hacerse directamente en el deposito del equipo a utilizar. Basta diluir la cantidad seleccionada del producto en volumen de agua a aplicar. Agítese bien antes de llenar el tanque del equipo a utilizar para obtener una buena y uniforme solución.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Para obtener un control óptimo y económico **SORBA® 50 EC** debe ser aplicado tan pronto se observen los primeros estadios larvales de la plaga a controlar. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7 - 10 días de acuerdo a la reinfestación o a la presión de la plaga. Para alcachofa, algodón, cítricos, frijol, vainita, garbanzo, papa, tomate y pimiento realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña, siendo 1 campaña/año. En el caso de col, coliflor y col china realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña, siendo 2 campañas/año y para espárrago y maíz realizar 2 aplicaciones/año siendo 1 1/2 campañas/año (3 aplicaciones/año).

**PERIODO DE REINGRESO**

- No reingresar al área tratada antes de las 48 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

- **SORBA® 50 EC** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas mas comunmente utilizados; en caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

**FITOTOXICIDAD**

- **SORBA® 50 EC** a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

DESHECHO  
RACIO



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

