

Pantone 281 Pantone 293 Pantone 584 Pantone 199

Pantone 347 Pantone Black Pantone 7516

30 x 15 cms

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA,
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

**MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Durante el transporte y/o almacenamiento, así como en las operaciones de carga y descarga, evitar rupturas de los envases. Se debe observar estrictamente la prohibición de transportar y/o almacenar plaguicidas agrícolas y/o sustancias afines junto con personas, animales (domésticos, ganado o aves), alimentos (frescos o envasados), bebidas en general, medicinas (de uso humano y/o veterinario), forraje o cualquier otro tipo de alimentos para animales.
- **SORBA® 50 EC** es altamente tóxico para crustáceos (camarones). Tiene que ser estrictamente evitada la contaminación deliberada o accidental de cualquier fuente de agua. **SORBA® 50 EC** es tóxico para abejas. No aplicar cuando las abejas estén libando activamente.
- **SORBA® 50 EC** es irritante para los ojos y la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado del producto con la piel, siendo recomendable que la manipulación y/o aplicación del producto se haga empleando equipos de protección como guantes y botas de jebe, un protector de nariz y boca y un sombrero o gorro. Cualquier salpicadura a los ojos deberá ser lavada inmediatamente con abundante agua limpia y fresca.
- Evitar ingerir el producto, inhalar sus vapores o aspirar la neblina de aspersión. No comer, beber ni fumar mientras se manipula o aplica el producto. Una vez que el usuario finalice la labor debe bañarse con abundante agua, enjabonarse bien y cambiarse de ropa, la misma que deberá ser lavada antes de volver a usarse.
- Los equipos y utensilios utilizados deberán ser lavados con abundante agua limpia evitando botar los residuos del lavado en las acequias o canales de regadío, lagos, lagunas, estanques o en cualquier otro reservorio o cauce de agua.
- Almacenar el producto en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evite almacenar el producto a temperaturas menores a -5 °C o superiores a 35 °C. Almacénese fuera del alcance de los niños y preferentemente bajo llave.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Benzoylureas
- Si se sospechara de una intoxicación por el producto debe retirarse inmediatamente de la labor al afectado colocándolo en un ambiente ventilado y llamar inmediatamente al médico.
- Mostrar al médico el envase etiquetado del producto. Mientras tanto quitarle la ropa de trabajo y lavar con abundante agua limpia las partes contaminadas del cuerpo. Si el producto ha sido ingerido accidentalmente no debe inducirse el vómito. Sólo si el afectado está conciente se le debe suministrar una buena cantidad de carbón medicinal en abundante agua.
- Nada debe darse por la boca mientras el accidentado está sin conocimiento.
- **SORBA® 50 EC** no tiene antídoto específico. Aplicar terapia sintomática bajo supervisión médica. **En caso de Emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Devuelva el envase del triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

SORBA® 50 EC

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable - EC

Composición
Lufenuron50 g/L
Aditivos.....Hasta completar 1 L

Reg. N° 645-98-AG-SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú

René Descartes 170, Urb Sta. Raquel,

II etapa, Ate Vitarte - Lima

Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:

FARMAGRO

Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos - Lima

Tel: 614-1500 Fax : 614-1517; 614-1516

RUC: 20100180210

Formulado por :

Syngenta S.A.

Vía a Mamonal, Km. 6

Cartagena, Colombia.

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



Lote No :

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Los nombres de producto que comienzan con "S" o "M",
el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

CONTENIDO NETO

1 Litro

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO

- Para obtener un control óptimo y económico **SORBA® 50 EC** debe ser aplicado tan pronto como se observen los primeros estadios larvales de las plagas ya que es el momento en que estas son mas susceptibles. Repetir las aplicaciones a intervalos de 8 - 10 días de acuerdo a la reinfestación o a la presión de la plaga.

- Se recomienda aplicar **SORBA® 50 EC** con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de la planta, sobre todo en las zonas donde se encuentran comiendo las larvas de las plagas a controlar. De acuerdo a la experiencia práctica se recomienda emplear entre 200 a 400 litros de caldo insecticida por hectárea con plantas chicas y 600 litros de caldo insecticida por hectárea como mínimo con plantas desarrolladas.

- **SORBA® 50 EC** puede ser aplicado indistintamente con cualquier equipo convencional aéreo o terrestre (asperjadora manual, de motor o tractorizada) siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquilla tipo cónica. Cuando se utilice asperjadora de espalda a motor se debe calibrar previamente el equipo para procurar aplicar el volumen de insecticidas por hectárea indicado en el cuadro.

- **SORBA® 50 EC** es fácil de preparar y puede hacerse directamente en el deposito del equipo a utilizar. Basta diluir la cantidad seleccionada del producto en volumen de agua a aplicar. Agítese bien antes de llenar el tanque del equipo a utilizar para obtener una buena y uniforme solución.

PERIODO DE REINGRESO No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

FRECUENCIA ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Para obtener un control óptimo y económico **Sorba 50 EC** debe ser aplicado tan pronto como se observen los primeros estadios larvales de las plagas ya que es el momento en que estas son mas susceptibles. Repetir las aplicaciones a intervalos de 8 - 10 días de acuerdo a la reinfestación o a la presión de la plaga.

COMPATIBILIDAD

- **SORBA® 50 EC** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas mas comunmente utilizados; en caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

- **SORBA® 50 EC** a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos.

Responsabilidad Civil: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

