

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar; y usar máscara, guantes y ropa apropiada durante el manipuleo y aplicación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón, y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y bien ventilado.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Este producto puede causar irritación a los ojos, piel y tracto respiratorio.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazol

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Manténgase a los animales fuera de las zonas tratadas al menos durante 7 días después de la aplicación.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No aplicar el producto, ni lavar la ropa o el equipo utilizado en las aplicaciones cerca de fuentes de agua.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

VYDAN²⁵⁰ EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Triadimenol 250 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Registro N° 634-98-AG-SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: JIANGSU AIJIN AGROCHEMICAL CO., LTD
No.58 Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical Zone, Nanjing 211511, China.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 L**

F. de Form:
N° Lote:
F. de Venc:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- VYDAN²⁵⁰ EC** es un fungicida sistémico de acción inmediata y buen efecto residual, utilizado con gran eficacia en el control de oidios y royas.
- VYDAN²⁵⁰ EC** tiene acción preventiva, curativa y erradicante. Actúa inhibiendo la síntesis de esteroides en los hongos impidiendo su desarrollo.
- VYDAN²⁵⁰ EC** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en tercio del agua, agitar y luego completar el agua y mezclar hasta lograr una mezcla homogénea.
- VYDAN²⁵⁰ EC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora a motor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200 L	L/ha		
ALCACHOFA	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	100 - 150	—	3	0.5
CAFÉ	"Roya"	<i>Hemileia vastatrix</i>	200	—	15	0.5
CEBADA	"Roya"	<i>Puccinia graminis</i>	250	—	14	0.5 - 1.0
CEBOLLA	"Punta seca"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200-250	—	21	0.04
ESPÁRRAGO	"Roya"	<i>Puccinia asparagi</i>	250	0.5	14	0.5 - 1.0
	"Cercosporiosis"	<i>Cercospora asparagi</i>	300	0.6	14	0.1
FRIJOL	"Oidiosis"	<i>Erysiphe polygoni</i>	75	—	14	0.1
	"Roya"	<i>Uromyces phaseoli</i>	50 - 75	—	14	0.1
MANGO	"Oidiosis"	<i>Oidium mangiferae</i>	100	—	14	0.5 - 1.0
MANZANO	"Oidiosis"	<i>Podosphaera leucotricha</i>	100	—	14	0.5 - 1.0
MELOCOTONERO	"Oidiosis"	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	100	—	14	0.5 - 1.0
PÁPRIKA	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	150	—	14	0.5
VID	"Oidiosis"	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2.0

PC: Período de Carenacia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la infección y agresividad del hongo; también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Si la infección o ataque de la enfermedad es severo, se recomienda realizar una segunda aplicación 15 días después de la primera.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

VYDAN²⁵⁰ EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con captan. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

VYDAN²⁵⁰ EC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

