

VACOMIL-PLUS 50®

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Metalaxyl..... 150 g/kg
 Oxiclورو de cobre..... 350 g/kg
 Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Registro N° 994 - 2001 - AG - SENASA

Contenido Neto: **500 g**



Titular del Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
 Telf.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
 Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado por: VAPCO LTD.
 P.O. Box 17058 Amman 11195, Jordania.

Importado, Envasado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

N° Lote
 F. de Form.
 F. de Venc.

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- VACOMIL-PLUS 50® es un fungicida de baja toxicidad; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomar las siguientes precauciones básicas:
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
 - Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
 - Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón, y cambiarse de ropa.
 - Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
 - No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
 - Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
 - Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 - Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
 - Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
 CICOTOX 0-800-1-3040
 SILVESTRE (01) 617-3300

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase (bolsa interna) y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, manténgalos fuera de las zonas tratadas al menos dos días después de realizada la aplicación.
- Peligroso para los peces; no contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No armar restos de la aplicación o sobantes del producto, ni lavar el equipo o ropa utilizada en la aplicación en lugares cercanos a fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VACOMIL-PLUS 50® es un fungicida sistémico de formulación polvo mojable compuesto por dos ingredientes activos oxiclورو de cobre (fungicida de contacto) y metalaxyl (fungicida sistémico), que le brindan un efecto protector y curativo. Se recomienda usar VACOMIL-PLUS 50® para el control de hongos endoparasitarios (oomycetos) causantes de enfermedades en plantas cultivadas.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

VACOMIL-PLUS 50® se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje, suelo o cuajo de planta según la plaga a controlar, empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca o motor, lecnomas, parhuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad en el cultivo y si las condiciones son de alta humedad en el suelo.
- Se recomienda realizar hasta tres aplicaciones por campaña.
- Hacer una segunda aplicación 10 - 14 días después de la primera; sin embargo, si la incidencia del hongo es alta y las condiciones climáticas son frías realizar la segunda aplicación entre 7 y 10 días después.

COMPATIBILIDAD

VACOMIL-PLUS 50® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común; a excepción de los mercuriales, thiram, cal, azufre y ditiocarbamatos. Se recomienda realizar una prueba previa en caso de no conocerse su compatibilidad con otro plaguicida.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD

VACOMIL-PLUS 50® no es fitotóxico para los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Cuadro de usos: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | ENFERMEDADES | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | kg/á 200L | kg/ha | | |
| ALCACHOFA | "Mildiu" | <i>Bremia lactucae</i> | 0.5 | 1.0 | 15 | 0.05 |
| CEBOLLA | "Mildiu" | <i>Peronospora destructor</i> | 0.35 - 0.5 | 0.7 - 1.0 | 15 | 0.5 |
| PALTO | "Podrición radicular" | <i>Phytophthora cinnamomi</i> | 1.0 - 2.0 | - | Nd | 0.05 |
| PAPA | "Rancho" | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.35 - 0.5 | 0.7 - 1.0 | 15 | 0.05 |
| PAPRIKA | "Rancho" | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.5* | 1.0 | 7 | 0.05 |
| | "Hielo azul" | <i>Phytophthora capsici</i> | 0.5* | 1.0 | 7 | 0.05 |
| POBULLO | "Hielo azul" | <i>Phytophthora capsici</i> | 0.75* - 1.0 | 1.5 - 2.0 | 7 | 0.05 |
| VID | "Mildiu" | <i>Plasmopara viticola</i> | - | 1.5 - 2.0 | 66 | 1 - 50 |

LMR: Límite Máximo de Residuo.
 *Aplicar dosis de 0.5 kg/á 200 litros en infestaciones altas.
 *Aplicar dosis de 0.5 kg/á 200 litros en infestaciones bajas.

PC: Periodo de Carencia

