

20 mm

170 mm

20 mm

POLVO SOLUBLE - SP

Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

Req. N° 304-96-AG-SENASA



N° de lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: **500 gramos**

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

- **Grupo Químico:** Organofosforados.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Después de usar el contenido destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o
arroyos con los desechos y envases vacíos.

Es un insecticida de amplio espectro del grupo de los organofosforados que actúa por contacto y posee también actividad sistémica en las plantas. Impregnado en las semillas protege plántulas del ataque de plagas en sus primeros estadios de crecimiento.

Impregnación de semilla: Para el control de gusano cortador *Feltia* sp. usar **ORTHENE® 75 PS** a la dosis de 500 gramos por 100 kilogramos de semilla, preparando el producto en una solución con agua suficiente para mojar toda la semilla (p.e. 1 litro para 100 kg de semilla).

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 7-10 días.

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los otros productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

ORTHENE® 75 PS no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO							
CULTIVO	Plaga		Dosis			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre científico	Nombre común	%	kg/ha	kg/cilindro		
Algodón	<i>Aphis gossypii</i>	Pulgón de la melaza	0.075-0.1	0.3-0.5	-	14	2.0
	<i>Tuta absoluta</i>	Poilla	0.1-0.2	0.5-1.0	-	14	0.01
Papa	<i>Premnotypes suturalis</i>	Gorgojo de los Andes	-	0.3-0.5	0.3-0.5	-	-
Zapallo	<i>Diaphania nitidalis</i>	Perforador de frutos	0.2-0.3	1.0-1.5	-	7	4.0
Col	<i>Brevicoryne brassicae</i>	Pulgón	0.1-0.2	0.5-1.0	-	7	8.0
Tabaco	<i>Heliothis virescens</i>	Gusano de la yema	0.15-0.3	0.75-1.5	-	7	N.A.
Arroz	<i>Tagosotes</i> (=Sogatodes) <i>orizicolus</i>	Cigarrita del virus de la hoja blanca	-	0.5	0.5	15	1
	<i>Hydrellia wirthi</i>	Mosca minadora de arroz	-	0.5	0.5	-	-
Cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	Thrips	-	0.2-1.0	0.4-0.5	14	0.01
Maiz, algodón	<i>Feltia sp.</i>	Gusano cortador	500 g x 100	Kilogramos de semilla	N.A.	N.A.	N.A.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón) **P.C.:** Periodo de carencia (días) **N.A.:** No aplica



10

20

ET304-96-AGV004-500