

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Literal 27.00 cm.

09 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No vivo por ingestión y por contacto con la piel.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fosforotilato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como estimulación del canal respiratorio, náuseas, anemia, inapetencia, malestar y vómito, cansancio, vértigo, inhibición de los movimientos de las articulaciones.
- En caso de contacto con los ojos lávalos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, TESALUD: 011-4000 0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada



FUJI-ONE® 40

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Isoprothiolane 400 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. N° 160-96-AG-SENASA



Tecnología Química y Comercio S.A.

Calle René Descartes N° 311,
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565 Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:

Nihon Nohyaku Co., Ltd
Kyobashi OM Building, 19-8,
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo 104-0031, Japón
Telf.: 81-3-3278-0461

Distribuido por:

AgroKlinge
Agro Klinge S.A.
Calle René Descartes N° 311,
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565 Fax: 348-1020

Lote N°:

F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido

Neto: 1 L

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FUJI-ONE 40 EC es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa que controla una amplia gama de hongos patógenos en diversos cultivos. FUJI-ONE 40 EC está recomendado para el control eficaz del "Quemado del arroz", "Oidium" del frijol y "Manchas foliares" producidas por *Alternaria* y *Cercospora*. FUJI-ONE 40 EC es empleado en pulverizaciones en mezcla con agua. Las aplicaciones pueden hacerse con cualquier equipo de aspersión terrestre en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400-500 L/ha.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS mitil. 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	"Quemado del arroz"	<i>Pyricularia oryzae</i>	400-500	14	2
MARYGOLD	"Mancha foliar"	<i>Alternaria solani</i>	500	7	0,1
ESPÁRRAGO	"Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	500	15	0,01
TOMATE	"Mancha azul"	<i>Phytophthora capsici</i>	500	15	0,01
MELOCOTÓN	"Mocho gris"	<i>Cladosporium fulvum</i>	500	*	0,1
	"Monilia" o "Hilo"	<i>Monilia fructicola</i>	400-500	*	0,1
VID	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	500	112	0,01

PC = Período de curación L.M.R. = Límite máximo de residuos

(*) Aplicación en el momento de brotación

(**) Aplicación hasta el momento de brotación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para el "Quemado del arroz" *Pyricularia oryzae*, en plantas desarrolladas, aplicar antes del "panojado" o floración, repetir a los 15 días. Para los cultivos de tomate, *merygold*, *espárrago* y *frijol*, iniciar las aplicaciones cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando se observen los primeros síntomas. Las aplicaciones en **melecotenero** deben hacerse al inicio del brotamiento y alternando con otro ingrediente activo de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas. **RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

