

DANTOTSU® 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Clothianidin.....500 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 081-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

SMTM PERU S.A.C.

Av. República de Panamá
3531 Int. 1203
Lima - Perú

IMPORTADOR -DISTRIBUIDOR:



We create chemistry

BASF Peruana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915 – Callao 1

Casilla 3911 Lima 100

Telf: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2519

CONTENIDO NETO:

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas tanto de uso humano como animal.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Cloronicotinilo

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, si el contacto fuese con la piel, lavarse con agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental inducir vómito y no suministrar nada.

Nota al médico: Tratar sintomáticamente. No tiene antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION

Emergencia CICOTOX Tel.: 0800-3040

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Dantotsu 50 WG es un insecticida con actividad altamente sistémica en la planta, es absorbido rápidamente por las hojas y raíces de las plantas. Controla los insectos por contacto e ingestión afectando su sistema nervioso. (Modo de Acción IRAC 4A).

Poner la dosis recomendada en 4 litros de agua, luego verter la mezcla en el equipo de aplicación y completar con agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	g/ha	g/200 L		
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	-	100 - 110	14	0.5
	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes orizicolus</i>	-	150		
Espárrago	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	400	160	30	0.04
Mandarina	Minador de hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.03–0.05%	60 - 100	14	0.07
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	140–280	40 – 60	14	0.05
	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	-	200 - 300	14	0.2
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	450–500	-	33	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100–140	40 – 60	14	0.05
	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	300 – 400	-	7	
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Dysmicoccus brevipes</i>	0.05%	-	30	0.7

PC = Período de carencia LMR = Límite Máximo de Residuos.

Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar Dantotsu 50 WG al inicio de la infestación de la plaga.

Efectuar un máximo, de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo entre 10 a 14 días.

En espárrago, aplicar solo al follaje, **nunca sobre turiones en cosecha.**

En papa, para el control de Gorgojo de los Andes iniciar la aplicación en la emergencia de las plantas mojando bien el cuello o tercio inferior de las plantas, realizar buena cobertura al follaje.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD: Dantotsu 50 WG es compatible con insecticidas y fungicidas en general. Se recomienda rotar a las aplicaciones con insecticidas de diferente grupo químico para evitar resistencia y mantener su eficacia.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y usos que se indican en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE

DE LOS NIÑOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.

- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes con agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

- No aplicar en los suelos con Napa Freática superficial.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

- Utilizar el agua del lavado sobre el cultivo que se está aplicando.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

