

DANTOTSU® 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:
Clothianidin.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 081-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

SMTM PERU S.A.C.
Av. República de Panamá
3531 Int. 1203
Lima - Perú

FORMULADOR:
Sumitomo Chemical Takeda Co., Ltd.
27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku,
Tokio 104-8260, Japan

IMPORTADOR -DISTRIBUIDOR:



BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao 1
Casilla 3911 Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519

CONTENIDO NETO:

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas tanto de uso humano como animal.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Cloronicotinilo

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, si el contacto fuese con la piel, lavarse con agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental inducir vómito y no suministrar nada.

Nota al médico: Tratar sintomáticamente. No tiene antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE
INTOXICACION
Emergencia CICOTOX Tel.: 0800-3040

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Dantotsu 50 WG es un insecticida con actividad altamente sistémica en la planta, es absorbido rápidamente por las hojas y raíces de las plantas. Controla los insectos por contacto e ingestión afectando su sistema nervioso. (Modo de Acción IRAC 4A).

Poner la dosis recomendada en 4 litros de agua, luego verter la mezcla en el equipo de aplicación y completar con agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	g/ha	g/200 L		
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	-	100 -110	14	0.5
	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes orizicolus</i>	-	150		
Espárrago	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	400	160	30	0.04
Mandarina	Minador de hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.03–0.05%	60 -100	14	0.07
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	140–280	40 – 60	14	0.05
	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturalis</i>	-	200 300	14	0.2
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	450–500	-	33	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100–140	40 – 60	7	0.05
	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	300 – 400	-		
Vid	Cochinilla harinosa (Aplicación foliar)	<i>Dysmicoccus brevipes</i>	0.05%	-	30	0.7
	Cochinilla harinosa (Aplicación suelo)	<i>Planococcus citri</i>	1000	-	NA	

PC = Período de carencia LMR = Límite Máximo de Residuos. NA=No aplica.
Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar Dantotsu 50 WG al inicio de la infestación de la plaga.
Efectuar un máximo, de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo entre 10 a 14 días.
En espárrago, aplicar solo al follaje, **nunca sobre turiones en cosecha.**
En papa, para el control de Gorgojo de los Andes iniciar la aplicación en la emergencia de las plantas mojando bien el cuello o tercio inferior de las plantas, realizar buena cobertura al follaje.
En vid, para el control de cochinilla harinosa vía suelo aplicar en drench en la zona radicular en la dosis indicada, antes de la etapa de floración, regar antes de aplicar y posteriormente.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas
COMPATIBILIDAD: Dantotsu 50 WG es compatible con insecticidas y fungicidas en general.
Se recomienda rotar a las aplicaciones con insecticidas de diferente grupo químico para evitar resistencia y mantener su eficacia.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y usos que se indican en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y
ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes con agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar en los suelos con Napa Freática superficial.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Utilizar el agua del lavado sobre el cultivo que se está aplicando.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

