

Tamaño: 15 x 12 cms MV 13.10.14

# BUPROMAX

## INSECTICIDA AGRICOLA

### POLVO MOJABLE - WP

#### COMPOSICIÓN:

- Ingrediente activo: Buprofezin .....250 g/kg
- Aditivos .....750 g/kg

“Reg. N° 782-98-AG-SENASA”

PRODUCTO PERUANO  
FORMULADO POR:



Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal)  
380, Of. 701 Miraflores, Lima 18 - Perú  
Teléfono: 446 -2896

DISTRIBUIDO POR:



Calle Cantuarias 270, Of. 1001  
Miraflores Lima 18 - Perú  
Teléfono: 51(1) 617-4000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

CONTENIDO NETO: 400 g.

NUMERO DE LOTE:

FECHA DE FAB.:

FECHA DE VCTO.:

## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es poco tóxico pero en su manejo es necesario tener en cuenta las medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas tales como:

- Leer detenidamente la etiqueta.
- Debe ser manejado por personal entrenado y provisto de guantes, máscaras, botas de jebe, anteojos y mamelucos.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, fumar, ni beber durante la aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse y bañarse con abundante agua y jabón.
- No transportar ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y veterinario.
- Manipule los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Guardar en un lugar fresco y seco, de bastante ventilación.

#### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación:

Llame inmediatamente al médico, mientras tanto tienda al paciente en un lugar ventilado y quitele la fuente de intoxicación o sea, que si ha ingerido el producto, provoque vómitos hasta que arroje la mayor cantidad posible de veneno que tenga en el estómago, si la intoxicación ha sido por la piel, quitele la ropa y lávela con abundante agua y jabón.

En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CICOTOX 0-800-1-3040  
Serfi S.A. 446-2896

#### NOTA AL MEDICO:

No tiene antidoto específico, todo tratamiento es sintomático.

DL/50 Oral Aguda : 8,792 mg/kg  
DL/50 Dermal Aguda : > 40,000 mg/kg

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BUPROMAX es un insecticida inhibidor de quitina, que actúa por contacto eficazmente sobre ninfas de mosca blanca y queresas. Respeta el control biológico y las abejas.

#### FORMA DE USO:

BUPROMAX se usa en pulverización sobre el follaje. Para preparar la solución de la aplicación se deberá colocar un poco de agua en un envase, agregar la cantidad de producto que se va a usar y agitar. Después se agrega el total de agua que se va a aplicar; es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de agua.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

#### USOS Y DOSIS:

| Cultivo | P l a g a s             |                                    | D o s i s        |                     | LMR<br>(ppm) | PC<br>(días) |
|---------|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
|         | Nombre<br>Común         | Nombre<br>Científico               | g/ L.<br>de agua | g/200 L.<br>de agua |              |              |
| Naranja | Mosca<br>blanca         | <i>Aleurothrixus<br/>floccosus</i> | 1.0              | 200                 | 14           | 0.3          |
| Olivo   | Queresa<br>blanca móvil | <i>Orthesia<br/>olivicola</i>      | 1.0              | 200                 | 14           | 0.3          |

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia.

En el caso del olivo y naranja las aplicaciones deben ser de pulverización bien fina, usando no menos de 1000 L/ha de solución

Período de Reingreso: 24 horas

**Compatibilidad:** Puede ser mezclado para pulverizaciones con agroquímicos de uso convencional: insecticidas, fungicidas, fertilizantes.

**FITOTOXICIDAD:** No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** el titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

