

TREBEN®



FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Ingrediente activo:

Benomyl 500 g/Kg
 Aditivos 500 g/Kg

Registro PQUA N° 102 - SENASA

Titular de Registro:

POINT ANDINA S.A.
 Calle Loreto Mz A6 Lote 15,
 Urb. Santa Patricia, II Etapa. La Molina.
 Lima 12 - Perú.
 Tel.: (01) 348-1018 / (01) 349-9609



Fabricado y Formulado por:

Kajo Agrochemical Co. Ltd.
 China.

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
 Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
 Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Contenido Neto: **200 g**

F. de Form.:
 N° Lote:
 F. de Venc.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

- No aplicar a menos de 5 m de fuentes de agua.
- **Tóxico para abejas. No aplicar en épocas de floración.**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TREBEN® 500 WP, es un fungicida sistémico que al ser aplicado sobre el follaje es trasladado por la savia hacia toda la planta; y al ser aplicado a las raíces éstas lo absorben y lo trasladan a toda la planta. Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor. Para semillas, sumergirlas por 3 a 5 minutos para una mejor impregnación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

TREBEN® 500 WP puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo. Las aplicaciones foliares y/o en semillas pueden ser preventivas o curativas, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se presentan las condiciones favorables para el desarrollo de dicha enfermedad. Numero máximo de aplicaciones: 3 campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No deberá entrar a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TREBEN® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

TREBEN® 500 WP no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

TELEFÓNOS DE EMERGENCIA
 CICOTOX 0-800-1-3040 ó 328 7398

ESSALUD 0801-10200 ó 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado para este fin.
- No arrojar envases vacíos o residuos en fuentes de agua.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS g/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO			
ESPÁRRAGO	"Fusarium"	<i>Fusarium oxysporum</i>	2000-3000	-	5
MELOCOTONERO	"Oidium"	<i>Sphaeroteca pannosa</i>	500	14	15
VID	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1000	-	5

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carencia.



L. TREBEN
 L. SILVESTRE
 L. T. LAVADO



PANTONE 343 C

L. TREBEN
 L. PINERAL



PANTONE 377 C

B. TOXICOLÓGICA
 L. T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE