

20.5cm

0,7 cm

3 mm

Opera®

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspoemulsión (SE)

COMPOSICION:

Pyraclostrobin	133 g/L
Epoxiconazole	50 g/L
Aditivos hasta completar	1 L

Registro PQUA N°. 064 - SENASA



The Chemical Company

TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.
Av. O.R. Benavides 5915 Callao 1
Casilla 3911, Lima 100
Telf.: (01) 513 2500
Fax : (01) 513 2518 - 513 2519

FABRICADO POR:

BASF Española S.L.
Carretera N-340 Km. 1.156
43006 Tarragona
España

Fecha de Fabricación:

16 mm

Fecha de Vencimiento:

N° de Lote:

Contenido Neto: 250 ml

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

© Marca Registrada BASF SE

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- El producto es moderadamente tóxico por ingestión e inhalación y puede causar irritación al aparato respiratorio.
- Es irritante a la piel y ligeramente irritante a los ojos.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascarara respiradora y lentes protectores y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar en casas habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Usar solamente el producto que viene en envase original.
- Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - Retirar al paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, mantenerlo en reposo y pida ayuda médica.
 - No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - En caso de ingestión: NO PROVOCAR VÓMITO. No suministrar nada vía oral.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

En caso de emergencia toxicológica llamar a:

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)
BASF Peruana S.A.: 513 2505

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Colocar los envases vacíos en lugares autorizados para este fin por las autoridades.
 - No disponer con residuos municipales.
 - Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - El producto es tóxico para el ganado y peligroso para la fauna silvestre.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Opera® es un producto con doble modo de acción en los hongos: inhibe la biosíntesis de ergosterol a nivel de las membranas celulares y la síntesis de ATP en la mitocondria, procesos esenciales para el desarrollo de los hongos. Por su distribución en la planta: actúa inhibiendo la germinación de las esporas y el desarrollo de los tubos germinativos en la parte externa de los tejidos por acción de pyraclostrobin (contacto) y una vez dentro de los tejidos se inhibe el desarrollo del hongo por acción de epoxiconazole (sistémico). Se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada, completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación. Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser usados.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

- Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.
- El intervalo entre aplicaciones puede ser de 14 y 21 días.
- En maíz realizar dos aplicaciones, la primera en el estado de crecimiento vegetativo (6 a 7 hojas) y la segunda al iniciarse la formación de la panoja. Se recomienda efectuar buena cobertura al follaje con un volumen de agua no inferior a 500L.
- En Maíz para el incremento de productividad efectuar dos aplicaciones, la primera durante la fase vegetativa de crecimiento rápido (40-45 días aproximadamente) y la segunda al inicio de la formación de la panoja, usar un volumen de agua entre 400 a 500 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO:

- Se recomienda no reingresar a las áreas tratadas antes de 12 horas de realizado el tratamiento.

FITOTOXICIDAD:

- No es fitotóxico para los cultivos recomendados siguiendo las instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD:

- Opera®** no es compatible con productos marcadamente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



NEGRO

AMARILLO

ZONA DE PEGA