

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, cólicos, molestias en el pecho, constricción de pupilas, sudor, pulso lento, temblores musculares. Si estos síntomas aparecen, proporcione primeros auxilios y acuda a un médico inmediatamente.

PRIMEROS AUXILIOS

•Grupo Químico: Carbamato

En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.

Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

En caso de emergencias llamar a:
ESSALUD EN LINEA: 411 8000 opción 4
CICOTOX: 328 7700
CIPROSQUIM: 0800-150847

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para invertebrados acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
- No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.
- Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

No utilice este envase para guardar alimentos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Sólido (polvo)
Color : Blanco
Olor : Ligeramente sulfuroso
pH : 6.0 - 8.0
Densidad : 0.59 - 0.69 g/ml
Producto inflamable: No inflamable
Tipo de envases: Bolsa de aluminio trilaminado.
Presentaciones: 100 g, 200 g, 500 g y 1 Kg.

Titular de registro, Importador y Distribuidor:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.
Calle Jorge Vanderghen N° 315
Miraflores
Lima - Perú



Formulado por:
Point Agro-China Ltd.
Wan Shi, Yixing, Jiangsu,
214217, China
Tel. (86-510) 8785 1001



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Registro PQUA N° 116-SENASA


Composición :
Methomyl 900 g/Kg
Aditivos 100 g/Kg

Grupo químico:
Carbamato

Nombre químico(IUPAC):
S-metil-N (methylcarbamoyloxy)
thioacetimidate

Fórmula empírica, peso molecular
C₅H₁₀N₂O₂S
PM=162.23

Fórmula estructural




NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la operación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinales de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DALE 90 SP es un insecticida carbamato de amplio espectro de acción y tiene efecto inmediato. Posee acción sistemática ascendente y actividad translaminar cuando se aplica al follaje. Actúa por contacto e ingestión sobre adultos, ninfas y larvas de muchas especies de insectos, en especial lepidópteros, y también por contacto sobre los huevos de algunas especies.

Se aplica con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme. Para su preparación llenar con agua hasta la mitad del tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

NUMERO MÁXIMO DE APLICACIONES POR CAMPAÑA/AÑO:
2 aplicaciones campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:
No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
DALE 90 SP es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

FITOTOXICIDAD:
DALE 90 SP no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta, cuando se aplica a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	g/200L		
Tomate	Gusano del fruto	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4	200	7	1
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.5 - 0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	Barrenador de brotes	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	5	2
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4	200	5	2
Espárrago	Copitarsia	<i>Copitarsia turbata</i>	0.4	200	5	2
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.4	200	5	2
Pimiento	Gusano del fruto	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.4	200	3	1
Pimiento	Barrenador de brotes	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	3	1
Pimiento	Spodoptera	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4	200	3	1
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.4 - 0.6	200-300	10	0.2
Alcachofa	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4	200	N.d	0.2
Alcachofa	Barrenador de brotes	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	N.d	0.2
Sandía	Perforador de guía	<i>Diaphania nitidalis</i>	0.4 - 0.6	200-300	3	0.2
Palto	Fiorinia	<i>Fiorinia fioriniae</i>	-	200	1	0.05
Palto	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	-	200	1	2
Palto	Chinche del palto	<i>Dagbertus minensis</i>	-	200	1	2
Col	Gusano de hoja	<i>Plutella xylostella</i>	0.4 - 0.6	200-300	3	0.05
Alfalfa	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	-	200	7	10
Naranja	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	-	200-300	3	1

LMR= Límite máximo de Residualidad, en partes por millón (ppm).
PC= Periodo de carencia.
N.D.= No determinado.

