

DITHANE® M-45

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajajes.
• Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.


El producto es sensibilizante a la piel. El contacto prolongado o repetido causa reacciones alérgicas a la piel.

Evitar la exposición del producto en mujeres embarazadas.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PQUA N° 122-SENASA

Telf. 2084702



FABRICADO POR:
Dow AgroSciences LLC
Apartado Aéreo 53895
Bogotá-Colombia

LOTE No.:

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMMABLE - NO CORROSIVO

*Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC

DITHANE M-45 es un fungicida de amplio espectro con acción de contacto, perteneciente al grupo de los diflicarbamatos. Se trata de una sustancia que, al ser aplicada, se transforma en un potente fungicida. Se emplea en pulverizaciones previas mezcla con agua. Se evita la oosis de **DITHANE M-45** en una pequeña cantidad de agua agitando hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Luego, al agregar el resto de agua se va diluyendo. Los granos de arena, deben mezclarse con el fungicida en un depósito apropiado a la cantidad de semilla que se desea desinfectar procurando conseguir la uniformidad de contacto del producto con esa semilla mediante el movimiento lento de la mezcla con un palo u otro utensilio apropiado. Para aplicaciones terrestres, pueden usarse los equipos de espada, de barra acoplada al tractor. Atomizadores con boquillas de diámetro superior a 3 mm y plátol. El volumen de solución varía de acuerdo con el tamaño del cultivo y el número de hectáreas. Rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

CUADRO DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD N. Técnico / N.Comun	DOSIS (kg / ha)	Periodo de curencia (dias)	*LMR (ppm)
ALGODON	<i>Alternaria tenuis</i> / Mancha negra de la hoja	1.5 - 2	7	0.5
AJI	<i>Cercospora capsici</i> / Cercosporiosis	1.5 - 2	7	0.5
HABA	<i>Cercospora fabae</i> / Mancha de la hoja	1.5 - 2	7	0.1
NARANJO	<i>Bolytis cinerea</i> / Podredumbre gris de flores	1.5 - 2	7	0.1
PAPA	<i>Phytophthora infestans</i> / Hielo, Mancha <i>Alternaria solani</i> / Mancha negra de la hoja	1.5 - 2	7	0.2
TOMATE	<i>Alternaria solani</i> / Mancha negra de la hoja	1.5 - 2	7	4.0
MELON PERNILLO SANDIA	<i>Pseudoperonospora cubensis</i> / Mildiu	1.5 - 2	7	1.0
ARROZ (semea)	<i>Helminthosporium oryzae</i> / Mancha carmella	2.0 - 5.0 kg/semea	-	-
%	Per 100 L de agua	Per cilindro 200 L	Per mochila 15 L	
0.2 - 0.25	200 g - 250 g	400 g - 500 g	30 g - 37.5 g	

*L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones deben hacerse en intervalos de 7 a 14 días. Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar de manera preventiva, antes de la aparición de los síntomas, cuando las condiciones climáticas sean apropiadas para la aparición de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

COMPATIBILIDAD: DITHANE M-45 es compatible con los insecticidas y fungicidas de uso común; se descompone en condiciones ácidas y alcalinas.

FITOTOXICIDAD: El producto no produce fitotoxicidad sobre los cultivos recomendados utilizándose de acuerdo a las instrucciones dadas. Evitar aplicar en el cultivo de melón durante la floración pues podría afectarse la germinación del polen.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

