15,3 ± 0,5

1,0 ± 0,5

1,0 ± 0,5

35,5 ± 0,5

AMIPRID® 20 SP

INSECTICIDA AGRICOLA

Polvo Soluble (SP)

Composición Química:

Acetamiprid ..... 200 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 131-SENASA

Titular del Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

Formulado por: **VAPCO MANUFACTURING CO. LTD.**
Amman. Shmesani. Shaker Bin Zaid Street.
Jordania. Telf.: 000962 6 5694991

Importado y Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

Contenido Neto: **500 g**
Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

Silvestre Protección Vegetal

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

2,8

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

Medidas en cms.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajes y/o semillas.
- Después de usar este producto, báñese con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, inutilizar y depositar el envase en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al Médico: tratamiento sintomático .

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
SILVESTRE (01) 617-3300

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y atrópodos benéficos.
- No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivo de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napa freática superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AMIPRID® 20 SP es un insecticida de amplio espectro que presenta una actividad translaminar y sistémica, actuando por contacto e ingestión.
AMIPRID® 20 SP es empleado a través de aplicaciones foliares.
AMIPRID® 20 SP actúa como un análogo de acetilcolina, transmisor químico natural de los impulsos nerviosos, produciendo una excitación nerviosa continua en el insecto que le provoca la muerte.
AMIPRID® 20 SP se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizador a motor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

COMPATIBILIDAD

AMIPRID® 20 SP es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes.Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo.
Se debe realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña.
En plantas de tomate, se recomienda la aplicación después de 3 meses de la siembra.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/cil. 200 L		
ARROZ	"Sogata"	*Tagosodes oryzicola*	0.1	100	14	0.01
CEBOLLA	"Trips"	*Thrips tabaci*	0.3 - 0.6	100 - 200	7	0.01
ESPÁRRAGO	"Mosquilla de los brotes"	*Prodiplosis longifila*	0.5	100 - 200	7	0.01
PALTO	"Queresa del palto"	*Fiorinia fioriniae*	0.5	100	Nd	0.01
MANDARINA	"Minador de la hoja de los cítricos"	*Phyllocnistis citrella*	0.5	100	7	14
PIMIENTO	"Mosca blanca" "Mosquilla de los brotes"	*Bemisia tabaci* *Prodiplosis longifila*	0.2 0.5	100 200	7 7	0.2 0.3
TOMATE	"Mosquilla de los brotes"	*Prodiplosis longifila*	0.2 - 0.4	100 - 200	1	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos **Nd:** No determinado **PC**: Periodo de Carencia.