grupo Silvestre	ETIQUETA	Revisión: 03 Aprobado: CR / JRD Fecha: 19-10-18 Página: 6 de 10
	AMIPRID 20 SP - NOVA CROP PROTECTION CO. LTD. (Bolsa 500 g)	

15,3 ± 0,5

2,0 ± 0,5 | 2,0 ± 0,5

35,5 ± 0,5

2,0

AMIPRID 20 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Soluble (SP)

Composición:
Acetamiprid : 200 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 131-SENASA

Silvestre
Protección Vegetal

Titular de Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **500 g**
N° de Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

Formulado por:
NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA.

NO CORROSIVO | NO INFLAMABLE | NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No envasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar simultáneamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Hongos arriba: que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito; si el paciente vuele a la conciencia, administrar carbón activado y sulfato de sodio.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua tibia por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Antídoto: Si se presenta en las víctimas en una zona ventilada. Aplicar respirador artificial, si la respiración es dificultada o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
INCOTEC: 0800-4-8040
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CENPISOS/BM: 0800-00447

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en ejercicio florecido.
- Nocivo para la fauna terrestre.
- Nocivo para el ganado. Mantengalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los peces y otros organismos acuáticos. No lave los equipos en lagunas o cuerpos.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto no aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositelo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AMIPRID® 20 SP es un insecticida de amplio espectro que presenta una actividad translaminar y sistémica, actuando por contacto e ingestión. **AMIPRID® 20 SP** es empleado a través de aplicaciones foliares. **AMIPRID® 20 SP** actúa como un análogo de acetilcolina, transmisor químico natural de los impulsos nerviosos, produciendo una excitación nerviosa continua en el insecto que le provoca la muerte.

AMIPRID® 20 SP se aplica mezclado con agua limpia a la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila o palanca, atomizador a motor, etc.) que asegure un perfecto reparto de formulación y adherencia adecuada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser precedida a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la infestación plagas-cultivo.

Se debe realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña.

En plantas de tomate, se recomienda la aplicación después de 3 meses de la siembra.

PERIODO DE REINGRESO

Puede ingresar al área tratada 48 horas después de aplicado el producto. En caso no requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD

AMIPRID® 20 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso corriente excepto con aguas carbonatadas, los de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

AMIPRID® 20 SP no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

13 Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, su eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha		
ALCACHOFA	"Mosca minadora"	*Amauromyza maculata*	300	-	7	0,7
ARROZ	"Sogata"	*Tagosodes orbicularis*	100	120	14	0,01
CEBOLLA	"Trips"	*Thrips tabaci*	100 - 200	300 - 600	7	0,02
ESPÁRRAGO	"Mosquita de los brotes"	*Prodiplosis longifila*	100 - 200	500	7	0,5
FRESA	"Trips"	*Thrips tabaci*	100 - 200	-	1	0,6
MANDARINA	"Minador de la hoja de los cítricos"	*Phyllocnistis citrella*	100	500	7	1
PALTO	"Queresa del palto"	*Fiorinia fiorniae*	100	500	NA	0,01
PIMIENTO	"Mosca blanca" "Mosquita de los brotes"	*Bemisia tabaci* *Prodiplosis longifila*	100 200	200 500	7 7	0,2 0,3
TOMATE	"Mosquita de los brotes"	*Prodiplosis longifila*	100 - 200	200 - 400	1	0,2
VID	"Chicharitas barrosas"	*Proyidocyrtes vityanii*	100	-	7	0,5
ARÁNDANO	Mosca blanca	*Aleurodicus jubilus*	100 - 200	-	7	2,0

PC: Período de Carencia (días). NA: No aplica. LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm, partes por millón).

Medidas en cms.

L. AMIPRID 20 SP TEXTO	L. AMIPRID 20 SP L. SILVESTRE	L. AMIPRID 20 SP	B. TOXICOLÓGICA
P. Process black c	PANTONE 343 C	PANTONE 377 C	P. YELLOW C

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de GRUPO SILVESTRE

ETIQUETA PROYECTO