

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA DE SEGURIDAD) ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es nocivo por ingestión e irritante para los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo Químico: Triazole.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400**

- No existe antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces e invertebrados acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superpuestas o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.



# TENAZ

## 250 EW

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW**

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole..... 250 g/L  
Aditivos c.s.p..... 1 L

**Reg. PQUA N° 132 - SENASA**  
**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:**  
**NEO AG SAC**

**Calle Melitón Porras 392, Miraflores - Lima**  
**Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401**

**Contenido neto: 1 L**

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Fabricado y Formulado por:  
SINOCHEM NINGBO, LTD.  
21 Jiangxia St. Ningbo 315000.  
CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: manchas foliares, pudriciones, royas, etc.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200 L	L/ha		
Alcachofa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	0.5 - 0.6	7	0.05
Café	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	250 - 300	--	30	0.1
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200 - 250	--	14	0.2
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200	0.5	40	0.05
Frijol	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	100	0.2	3	2
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	60 - 80	0.3 - 0.4	14	0.5
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante periodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

