

0.7 cm
0.9 cm
0.61 cm

0.61 cm
0.9 cm
1.00 cm
0.5 cm

Dithane™ F-MB

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- El producto es sensibilizante a la piel.
- El producto puede ser ligeramente irritante para los ojos y la piel.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Manténgalo lejos del fuego y de las chispas, guárdelo en un lugar fresco y seco. No permita que reciba mucho calor ya que esto puede ocasionar cambios en su composición química.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Ditiocarbamatos.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Si se produjera intoxicación involuntaria, provocar vómito dando a beber un vaso de agua con sal y hacer un lavado gástrico. En el caso de contacto con la piel, lavar con agua limpia y jabón todas las partes contaminadas.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 166, CISPROQUIM: 080-050-847
Corteve Agriscience Perú SAC: 4214811

Nota al médico: Funcicida del grupo de los carbamatos que tiene como antídoto el sulfato de ATROPINA que se administra por vía intravenosa o intramuscular hasta la completa recuperación.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino diseñado por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuélvase el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera del área tratada.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Composición:
Mancozeb..... 430 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA No. 135-SENASA

Titular del registro: Corteve Agriscience Perú S.A.C.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas. Santiago de Surco, Lima, Perú.

FÓRMULA POR:

Corteve Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 # 7-21, Torre A, oficina 1401,
Edificio Teleport Business Park,
Bogotá, D.C. Colombia

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

ARIS Industrial S.A.
Av.Industrial S.A.
Lima 1 - Perú
Telf.: (51-1)3365428

CULTIVOS	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	DOSIS %	P.C.*	L.M.R.**
PAPA Y TOMATE	Hielo o Rancha Tizón temprano	<i>Phytophthora infestans Alternaria solani</i>	2-3 2-3	-	7	0.2 2.5
ALGODÓN	Mancha negra	<i>Alternari tenuis</i>	2-3	-	7	0.05
AJÍ Y ROCOTO	Cercosporiosis	<i>Cercospora capsici</i>	2-3	-	7	5 4.0
HABA	Mancha de la hoja	<i>Cercospora fabae</i>	2-3	-	7	1
MANDARINA	Podredumbre gris Acaro del tostado	<i>Botrytis cinerea Phyllocoptruta oleivora</i>	3-5 3-5	-	7	5
MANGO	Antracnosis	<i>Colletotrichum sp</i>	4-6	-	7	2
CEBOLLA	Mildiu vellosa	<i>Peronospora destructor</i>	4-6	-	7	1.5
AJO	Mancha púrpura Anublo de la hoja	<i>Alternaria porri Botrytis alli</i>	4-6 4-6	-	7	0.6
PLÁTANO	Sigatoka amarilla Sigatoka negra	<i>Cercospora sp Mycosphaerella sp</i>	3-3.5 3-3.5	-	7	2
ARROZ	Mancha lineal Mancha circular	<i>Cercospora oryzae Helminthosporium sp</i>	4-6 4-6	-	7	0.05
MELÓN Y SANDÍA	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	3-3.5	-	7	1.5
CEBADA Y TRIGO	Oidium	<i>Erysiphe graminis</i>	2-3	-	7	0.05
ESPÁRRAGO	Cercosporiosis Stemphylium	<i>Cercospora asparagi Stemphylium vesicarium</i>	2-3 3-5	-	7	0.1
GRANADO	Corazón negro	<i>Alternaria alternata</i>	2-3	-	7	0.05
VID	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	-	0.4	14	1.5

*P.C. = Período de carencia **L.M.R. = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: Mínimo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Dithane™ F-MB es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxica a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONTENIDO NETO: 1 litro

No. DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

TM © Marcas registradas de Corteve Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteve.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

2.258 cr