

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

14,5 ± 0,3

2,2

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.

Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.

Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

El producto puede causar moderada irritación ocular.

El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazoles.

En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.

En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantenga a los animales fuera de las zonas tratadas al menos durante 7 días después de la aplicación.

El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas altas.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ECONOMÍA

TRIPLE LAVADO

SEGURIDAD

AMBIENTE

Titular del Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300

Contenido Neto: 20 L

Nº de Lote:

F. de Form:

F. de Venc:

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:

NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo,

Zhejiang Province. China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VERTICAL® 250 EW es un fungicida triazol, sistémico y de amplio espectro; con acción protectora curativa. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y distribuido dentro de la hoja.

VERTICAL® 250 EW es utilizado en aplicaciones foliares, para el control de enfermedades como: manchas foliares, pudriciones, royas, etc.

VERTICAL® 250 EW actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol es decir la dimetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo.

VERTICAL® 250 EW se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	ml/ha		
ALCACHOFA	Oidiosis	Leveillula taurica	-	500	7	0.05
ARROZ	Quemado del arroz	Pyricularia oryzae	200 - 400	200 - 400	35	2
CEBOLLA	Mancha foliar	Stemphylium vesicarium	200 - 250	500	7	0.05
ESPÁRRAGO	Roya	Puccinia asparagi	200 - 250	500 - 625	7	0.01
	Mancha foliar	Cercospora asparagi	200	500	7	0.01
	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium	200	500	7	0.01
MAÍZ	Mancha del asfalto	Phyllachora maydis	200	-	36	0.05
MANDARINA	Alternaria	Alternaria alternata	200	-	175	0.05
PAPA	Alternaria	Alternaria solani	200	-	30	0.05
VID	Oidiosis	Uncinula necator	60	-	21	2

P.C.: Período de Carenacia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones. Realizar máximo 04 aplicaciones por año. Repetir la aplicación en caso de reinfección.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: VERTICAL® 250 EW

es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos, bases y materiales oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

VERTICAL® 250 EW se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	ml/ha		
ALCACHOFA	Oídiosis	<i>Leveillula taurica</i>	-	500	7	0.05
ARROZ	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	200 - 400	200 - 400	35	2
CEBOLLA	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200 - 250	500	7	0.05
ESPÁRRAGO	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200 - 250	500 - 625	7	0.01
	Mancha foliar	<i>Cercospora asparagi</i>	200	500	7	0.01
	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200	500	7	0.01
MAÍZ	Mancha del asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	200	-	36	0.05
MANDARINA	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	200	-	175	0.05
PAPA	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	200	-	30	0.05
VID	Oídiosis	<i>Uncinula necator</i>	60	-	21	2

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantenga a los animales fuera de las zonas tratadas al menos durante 7 días después de la aplicación.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas altas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Silvestre

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



Medidas en cm

Envase: COEX