

28.3 ± 0.3 cm

0.8 ± 0.2

0.5 ± 0.2

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo Químico: Fenil pirasoles**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**CICOTOX: 0800 - 1 - 3040      NEOAGRUM SAC: 617-6400**  
**ALO ESSALUD: 0801-10200 (Gratis)**

- No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase Triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

# FULMINATE<sup>®</sup>

## 200 SC

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Fipronil ..... 200 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 201 - SENASA**

**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM SAC**



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
 Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

**Contenido neto: 1 L**

N° de Lote:  
 F. de Form.: "Ver parte superior"  
 F. de Venc.:

Formulado por:  
 BELIN INTERNATIONAL LIMITED  
 Suite 605/F, China Insurance Group Building,  
 Des Voeux Road Central, Hong Kong  
 CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**FULMINATE 200 SC**, es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, de baja toxicidad para las personas y animales de sangre caliente.

**FULMINATE 200 SC** es utilizado para el control efectivo, mediante aplicaciones foliares, contra diversas plagas insectiles: Escarabajo Perforador de Hojas, Gorgojo de los Andes, Escarabajo Colorado, Gusano de la raíz, etc., en diferentes cultivos presentando un buen efecto residual después de su aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

| CULTIVO  | PLAGA                   |                                    | DOSIS       |             | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
|          | Nombre Común            | Nombre Técnico                     | L /200L     | L/ha        |                |                 |
| Algodón  | Thrips                  | <i>Thrips tabaci</i>               | 0.175 - 0.2 | 0.35 - 0.40 | -              | 0.005           |
|          | Picudo                  | <i>Anthonomus vestitus</i>         | 0.15 - 0.2  | 0.3 - 0.4   | 14             | 0.01            |
| Cebolla  | Thrips                  | <i>Thrips tabaci</i>               | 0.10 - 0.15 | 0.2 - 0.3   | 14             | 0.02            |
| Papa     | Gorgojo de los Andes    | <i>Premnotrypes suturalicallus</i> | 0.2         | 0.4         | 14             | 0.02            |
| Pimiento | Mosquilla de los brotes | <i>Prodioplosis longifolia</i>     | 0.15 - 0.2  | 0.3 - 0.4   | 14             | 0.005           |

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Limite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique y cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** **FULMINATE 200 SC** puede ser empleado en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso frecuente.

**FITOTOXICIDAD:** **FULMINATE 200 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



15.0 ± 0.3 cm

2.3 cm