

28.3 ± 0.3 cm

0.8 ± 0.2

0.5 ± 0.2

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Fenil pirasoles**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 617-6400
ALO ESSALUD: 0801-10200 (Gratis)

- No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase Triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

FULMINATE®

200 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Fipronil 200 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 201 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:
 F. de Form.: "Ver parte superior"
 F. de Venc.:

Formulado por:
 SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
 29 Xiaohang Road, Nanjing
 CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FULMINATE 200 SC, es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, de baja toxicidad para las personas y animales de sangre caliente.

FULMINATE 200 SC es utilizado para el control efectivo, mediante aplicaciones foliares, contra diversas plagas insectiles: Escarabajo Perforador de Hojas, Gorgojo de los Andes, Escarabajo Colorado, Gusano de la raíz, etc., en diferentes cultivos presentando un buen efecto residual después de su aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L /200L	L/ha		
Algodón	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.175 - 0.2	0.35 - 0.40	-	0.005
	Picudo	<i>Anthonomus vestitus</i>	0.15 - 0.2	0.3 - 0.4	14	0.01
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.10 - 0.15	0.2 - 0.3	14	0.02
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturalicallus</i>	0.2	0.4	14	0.02
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.15 - 0.2	0.3 - 0.4	14	0.005

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique y cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas.

COMPATIBILIDAD: **FULMINATE 200 SC** puede ser empleado en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso frecuente.

FITOTOXICIDAD: **FULMINATE 200 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

15.0 ± 0.3 cm

2.3 cm

