LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraies
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Fenil pirasoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto
- fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 En caso de emergencia toxicológica llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 617-6400 ALO ESSALUD: 0801-10200 (Gratuito)

- No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración - Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos ríos estangues o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.



INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICION:	
Fipronil	200 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 201 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por: NEOAGRUM SAC



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

Nº de Lote:

F. de Form.: "Ver parte superior" F. de Venc.:

Formulado por: LEEDS LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED M-15,Greater Kailash-II, Opp. Arya, Samaj Mandir, New Delhi-11048-INDIA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FULMINATE 200 SC, es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, de baja toxicidad para las personas y animales de sangre caliente.

FULMINATE 200 SC es utilizado para el control efectivo, mediante aplicaciones foliares, contra diversas plagas insectiles: Escarabajo Perforador de Hojas, Gorgojo de los Andes, Escarabajo Colorado, Gusano de la raiz, etc., en diferentes cultivos presentando un buen efecto residual después de su aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

COADRO DE 0000								
CULTIVO	PLA	DOSIS		P.C.	L.M.R.			
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha	(días)	(ppm)		
Algodón	Thrips	Thrips tabaci	0.175-0.2	0.35-0.40	-	0.005		
	Picudo	Anthonomus vestitus	0.15-0.2	0.3-0.4	14	0.01		
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.10-0.15	0.2-0.3	14	0.02		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis longifila	0.2		21	0.005		
Рара	Gorgojo de los Andes	Premnotrypes suturicallus	0.2	0.4	14	0.02		
Pimiento	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis longifila	0.15-0.2	0.3-0.4	14	0.005		

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique y cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas.

COMPATIBILIDAD: FULMINATE 200 SC puede ser empleado en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso frecuente.

FITOTOXICIDAD: FULMINATE 200 SC no es fitotóxico para los cultivos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.











MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



















