

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ligeramente irritante a los ojos y a la piel.
- Ligeramente peligroso por inhalación.
- El producto es nocivo por ingestión.
- Evitar el contacto directo con la piel y la inhalación de vapores.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No reutilizar el envase vacío, ni para elementos ni para líquidos.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Grupo químico neonicotinoide.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Nota al médico:** tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
SILVESTRE (01) 617-3300

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

THUNDER[®] 350 SC

INSECTICIDA AGRICOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Imidacloprid 350 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 203-SENASA

Contenido Neto: **1L**

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.



Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Teléfono: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado por: **NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA
Teléfono: +86-25-52782915

Importado y Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO  **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **THUNDER[®] 350 SC** es un insecticida neonicotinoide de acción sistémica con amplio espectro de acción, especialmente efectivo contra insectos masticadores, minadores, chupadores y raspadores. Es absorbido fácilmente por vía radicular y foliar, y distribuido acropétalmente.
- **THUNDER[®] 350 SC** ejerce su modo de acción interfiriendo con la transmisión de los estímulos en el sistema nervioso central del insecto, causando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte del insecto.
- **THUNDER[®] 350 SC** se emplea diluido en agua; se sugiere no realizar pre-mezcla. Verter la dosis recomendada en el tanque de aplicación y agitar bien hasta hacer la mezcla homogénea.
- **THUNDER[®] 350 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca o motor, tecnomas, parihuelas). Iniciar las aplicaciones foliares luego de hacer un monitoreo de la plaga en el campo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml / cilindro 200 L	L/ha		
ESPÁRRAGO	Mosquilla de los brotes	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	200-250	0.4-0.5	21	0.05
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	200	0.5	7	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuo.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia de la plaga, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- En espárrago, iniciar las aplicaciones en la etapa de brotamiento. Se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.
- Dejar un intervalo mínimo de 10- 12 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en cultivos no objetivo a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con materiales altamente oxidantes, ácidos o alcalinos, ni con abonos foliares.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

