

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo Químico: Dinitroaniline**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente

**TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:**

- CICOTOX: 0800 - 1 - 3040
- NEO AGRUM SAC: 617-6400
- No se conoce antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- Utilizar una banda de protección hacia fuentes de agua no menor a 3 mt.

# SELLADOR 400 EC

## HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Pendimethalin ..... 400 g/L  
Aditivos c.s.p..... 1L

Reg. PQUA N° 146 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEO AG SAC

Calle Melitón Porras 392, Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

IPROCHEM COMPANY LIMITED

35F, Guomao Business Mansion, 3005 nsnhu RD.,

Luohu District, Shenzhen,

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

SELLADOR 400 EC es un herbicida selectivo que puede ser absorbido por raíces y hojas. Actúa inhibiendo la división celular durante la mitosis en los meristemas de tallos y raíces. Su uso es recomendado para el control de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha en diversos cultivos.

SELLADOR 400 EC debe ser aplicado sobre suelo húmedo en pre-emergencia de las malezas. Puede ser aplicado con pulverizadoras manuales de palanca (mochilas o equipos accionados por tractores).

Preparación de la mezcla: Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de SELLADOR 400 EC y completar con agua agitando constantemente hasta lograr una emulsión.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	MALEZAS		Dosis		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L / 200 L	L / ha		
Caña de azúcar	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1.25	2.5	N.D.	0.1
	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>				
	Cardosanto	<i>Argemone mexicana</i>				
	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
Capulí cimarrón	<i>Physalis peruviana</i>					
Cebolla	Quinua	<i>Chenopodium spp</i>	2.0	4.0	60	0.1
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Yuyo o Bledo	<i>Amaranthus caudatus</i>				
	Leptocloa	<i>Leptocloa filiformis</i>				
	Cardosanto	<i>Argemone mexicana</i>				
Alcachofa	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1.5	3.0	N.D.	0.05
	Yuyo	<i>Amaranthus caudatus</i>				
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>				
	Capulí	<i>Nicandra physalodes</i>				

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos N.D.: No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

En cultivos de siembra directa aplicar SELLADOR 400 EC inmediatamente después de la siembra. En cultivos de transplante aplicar SELLADOR 400 EC en pre-transplante. Realizar máximo una aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** SELLADOR 400 EC no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

