

0.8 ± 0.2

28.3 ± 0.3 cm

0.5 ± 0.2

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Dinitroarilina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No se conoce antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 617-6400  
CISPROQUIM: 0800-50-847 ALOESSALUD: 0801-10200 (Gratuito)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces; no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuencos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- Utilizar una banda de protección hacia fuentes de agua no menor a 3 metros.



# SELLADOR 400 EC

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Pendimethalin ..... 400 g/L  
Aditivos ..... C.S.p. 1 L

Reg. PQUA N° 146 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

N° de Lote: HANGZHOU CHANGCHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO.LTD  
F. de Form.: "Ver parte superior"  
F. de Venc.: 64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,  
Hangzhou, Zhejiang Province - CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

SELLADOR 400 EC es un herbicida selectivo que puede ser absorbido por raíces y hojas. Actúa inhibiendo la división celular durante la mitosis en los meristemas de tallos y raíces. Su uso es recomendado para el control de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha en diversos cultivos.  
SELLADOR 400 EC debe ser aplicado sobre suelo húmedo en pre-emergencia de las malezas. Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochilas) o equipos accionados por tractores.  
Preparación de la mezcla: Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de SELLADOR 400 EC y completar con agua agitando constantemente hasta lograr una emulsión.  
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	Nombre Común	Nombre Técnico	DOSES		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
			L/200L	L/ha		
Alecinota	Verdolaga Yuyo Hierba mora Capullí	Portulaca oleracea Amaranthus caudatus Solanum nigrum Nicotiana glauca	1.5	3.0	90	0.05
Caña de azúcar	Hierba gallinazo Cardosanto Rabo de zorro Pata de gallina Cajapil (amarillo)	Portulaca oleracea Chenopodium murale Ageratum mexicanum Sidaea verticillata Eriosema mexicanum Eriosema peruvianum	1.25	2.5	90	0.1
Cebolla	Quinua Pata de gallina Yuyo o Bello Lupulino Cardosanto	Chenopodium spp. Eriosema mexicanum Amaranthus caudatus Lepidochloa illinoensis Ageratum mexicanum	2.0	4.0	60	0.1
Espárrago	Hierba gallinazo	Amaranthus dubius Chenopodium murale	-	1.0	14	0.05

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** En cultivos de siembra directa aplicar SELLADOR 400 EC inmediatamente después de la siembra. En cultivos de transplante aplicar SELLADOR 400 EC en pre-transparente. Realizar máximo una aplicación.

**PERÍODO DE RENGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** SELLADOR 400 EC no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

15.0 ± 0.3 cm

2.3 cm



0007