

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: BENZOYLUREA

- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400
ALO ESSALUD: 0801-20200 (Gratuito)

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

-

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para artrópodos beneficiosos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 mt.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Lufenuron.....	50 g/L
Solvente nafta alifático ligero	450 g/L
Aditivos c.s.p	1 L

Reg. PQUA N° 210 - SENASA
Titular del Registro: NEO AGRUM S.A.C.

Importado y distribuido por:



Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

Nº de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,
Zhejiang Province
CHINA



NO CORROSIVO

INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

VERSATIL 50 EC es un insecticida sistémico inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina en los artrópodos plagas.

VERSATIL 50 EC es utilizado para el control del Gusano Perforador de bellotas y Gusano comedor de hojas en los cultivos de algodón y espárrago.

VERSATIL 50 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, de baja toxicidad para las personas y animales de sangre caliente.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L / 200 L	L / ha		
Algodón	Gusano perforador de bellotas	<i>Heliothis virescens</i>	0.25	0.5	30	0.01
Espárrago	Gusano comedor de hojas	<i>Copitarsia decolora</i>	0.2	0.4	14	0.02
	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	0.4	7	0.02
Maiz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	0.4	35	0.05
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.25	0.5	7	1
Tomate	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	0.15	0.3	7	0.5

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique y cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: VERSATIL 50 EC puede ser empleado en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD: VERSATIL 50 EC no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

