

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Cuidado, evite el contacto, solvente es posible carcinógeno.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Evitar inhalar la formulación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo químico: Benzoylurea**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 617-6400  
ALO ESSALUD: 0801-10200 (Gratis)

- No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 mt.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# VERSATIL 50 EC

## INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Lufenuron ..... 50 g/L  
Solvente nafta alifático ligero ..... 450 g/L  
Aditivos ..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° 210 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

**Contenido neto: 1 L**

Nº de Lote:  
F. de Form.: "ver parte superior"  
F. de Venc.:

Formulado por:  
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED  
29 Xiaohang Road, Nanjing  
CHINA



**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

VERSATIL 50 EC es un insecticida sistémico inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina en los artrópodos plagas.  
VERSATIL 50 EC es utilizado para el control del Gusano Perforador de bellotas y Gusano comedor de hojas en los cultivos de algodón y espárrago.  
VERSATIL 50 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, de baja toxicidad para las personas y animales de sangre caliente.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
Algodón	Gusano perforador de bellotas	Heliothis virescens	0.25	0.5	30	0.01
Espárrago	Gusano comedor de hojas	Copitarsia decolora	0.2	0.4	14	0.02
	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.2	0.4	7	0.02
Maíz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	0.4	35	0.05
Pimiento	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.25	0.5	7	1
Tomate	Gusano ejército	Spodoptera eridania	0.15	0.3	7	0.5

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuo

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique y cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** VERSATIL 50 EC puede ser empleado en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:** VERSATIL 50 EC no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

