

DK-DIONE

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo:

Iprodione 500 g/kg
Aditivos csp1kg

Reg. PQUA N° 147 – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A. Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores
Teléfono: 219 - 3901 / Fax: 219 - 3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:

KINGTAI CHEMICAL Co, LTD.
Jianxing, Zhejiang Province
Teléfono: 86 573 2718486
Fax: 86 573 2716545

ENVASADO POR:

DROKASA PERÚ S.A. Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial
Independencia. Teléfono: 219 - 3901

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.
Av. 28 de Julio N° 150 Piso 7 - Miraflores
Teléfono: 219 - 3901 / Fax: 219 - 3929



CONTENIDO NETO: 1 Kg.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

COD. 570878



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es nocivo si se ingiere o si entra en contacto con la piel.
- Este producto es muy tóxico por inhalación, no respire el polvo.
- Este producto es irritante a los ojos, sistema respiratorio y a la piel.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacene, ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximide
- Evite la inhalación y el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas.
- Si el producto es ingerido y el paciente esta conciente dele 2-3 vasos de leche o agua e induzca al vómito.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**
CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó
ESSALUD Telf.: 423-7600
- **NOTA AL MÉDICO:** Tratamiento sintomático y de sostén. No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya éste envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para éste fin.
- No disponer los envases con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- **“PELIGROSO para organismos acuáticos”.**
- “No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos”.
- “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrante del producto.”
- “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros”.
- “Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre”. “No permitir animales en el área tratada”.
- “El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”.
- “Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales”.
- “En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades para este fin”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DK-DIONE es un fungicida del grupo de las dicarboximidias. actúa por contacto evitando las infecciones de las enfermedades en los cultivos ya que inhibe la germinación de las esporas y/o bloquea el desarrollo del micelio.

DK-DIONE se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

Para papa, en un cilindro de 100 litros de agua disolver de 250-300 gramos de DK-DIONE, luego sumergir las semillas por 2 ó 3 minutos. Ésta mezcla debe alcanzar para 1 TM de semilla.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DK-DIONE es utilizado cuando las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la enfermedad. Debido a la persistencia del producto el cultivo estará protegido durante aproximadamente 3 semanas.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones al año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

DK-DIONE, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola y fertilizantes foliares excepto aquellos de reacción alcalina.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200 L		
Fresa	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0 - 1.5	-	5	10
Vid	Mancha chocolate	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5 - 2.0	0.3 - 0.4	14	10
Palto	Mancha chocolate	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.2 - 0.3	14	0.02
Tomate	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	1.5 - 2.0	-	14	5
Cebolla	Podredumbre gris o moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5 - 0.6	19	0.2
	Mancha del peral	<i>Stemphylium versicarium</i>	-	0.6 - 0.7	7	0.2
Mandarina	Mancha chocolate	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.4	30	1
Páprika	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.4	14	5
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	250-300 gramos en 100 litros de agua para 1 TM de semilla*		14	0.02

(*) Sólo para uso en semilla de papa por inmersión

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

COD. 570889

