

Arranque[®] 90% PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN:

Methomyl 900 g/Kg
Aditivos: c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 153-SENASA

“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”



TITULAR DE REGISTRO

Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.
Av. Javier Prado Este N° 6726,
Urb. Santa Patricia, etapa II Interior 301A
La Molina, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 499-7831

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.
Av. Nicolás Arriola 2374 - San Luis
Lima - Perú
Teléfono: (01) 547-0638

FORMULADO POR:

Jiangyin Dayo Chemical Co., Ltd.
No. 18, Qingtong Rd., Qingyang.
Jiangyin Jiangsu
China

Contenido Neto: **200 g**

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

Marca: ● PANTONE 294 C

● PANTONE 285 C

● PANTONE 291 C

● PANTONE 200 C

Banda: ● PANTONE 199 C

Logo de INAP

PANTONE: 129 C

PANTONE: 7480 C

PANTONE: 7479 C

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire el polvo o aspersión.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado
- Almacenar el producto en lugares frescos y ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas o forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar el equipo de protección durante el mezclado y aplicación.
- Después de usar el producto retirar toda la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Carbamatos

En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar urgente al paciente al centro médico más cercano. El antídoto es el sulfato de atropina que debe ser suministrado en dosis múltiples hasta que el paciente este atropinizado.

Dosis inicial: 1 - 2 mg de sulfato de atropina vía intravenosa cada 10 a 20 minutos hasta que el paciente haya mejorado.

En caso de ingestión, no induzca al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral o en una persona inconsciente.

En contacto con los ojos, enjuagarlos con bastante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: (01) 328-7700 / ESSALUD: 411-8000 Opción 4
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: (01) 499-7831

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ARRANQUE 90% PS es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

ARRANQUE 90% PS se aplica con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad del tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	g/cil		
Tomate	"Gusano del fruto"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4	200	7	1
Maíz	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.5 - 0.6	250 - 300	7	0.1
Espárrago	"Barrenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	1	2
Pimiento	"Gusano del fruto"	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.4	200	3	1
	"Barrenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	3	1
Cebolla	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.4 - 0.6	200 - 300	7	0.2
Alcachofa	"Barrenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	10	0.2
Palto	"Queresa"	<i>Floriania floriniae</i>	-	200	1	2
Vid	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	-	200	14	0.3

P.C. = Periodo de Carencia. L.M.R. = Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Una Palto: Realizar máximo una (01) aplicación por campaña. Una (01) campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

ARRANQUE 90% PS es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

FITOTOXICIDAD:

ARRANQUE 90% PS no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.



Banda: ● PANTONE 199 C