

28.30 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es nocivo por ingestión
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al area tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Neoconocotenoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- No existe antidoto específico. Siga tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

# MEGAPRID

## 200 SL

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**COMPOSICIÓN:**

Acetamiprid ..... 200 g/L  
Aditivos ..... 800 g/L

Reg. PQUA N° 220 - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM SAC



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L  
N° de Lote:  
F. de Form.: "Ver parte superior"  
F. de Venc.:

Fabricado y Formulado por:  
SINOCHEM NINGBO LTD  
21 Jiangxia St., Ningbo 315000  
CHINA

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

MEGAPRID 200 SL es un insecticida sistémico traslaminar, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión.  
MEGAPRID 200 SL es utilizado para el control de insectos chupadores-masticadores tales como: Mosquilla de los brotes, Arrebiatado, etc.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO   | PLAGAS                  |                              | Dosis    |         | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------|------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común            | Nombre Técnico               | ml/200 L | L/ha    |                |                 |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | <i>Prodiplosis longifila</i> | 200-300  | 0.4-0.6 | 7              | 0.05            |
| Algodón   | Arrebiatado             | <i>Dysdercus peruvianus</i>  | 200-300  | 0.4-0.6 | 7              | 0.05            |
| Pimiento  | Prodiplosis             | <i>Prodiplosis longifila</i> | 200-300  | 0.4-0.6 | 1              | 0.1             |

P.C.: Período de carencia      L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento, previos monitoreos del campo de cultivo, considerando el grado de infestación de la plaga.  
Realizar como máximo de 3 aplicaciones por campaña para los cultivos mencionados.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.


**COMPATIBILIDAD:** MEGAPRID 200 SL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. La mezcla con otros productos debe ser probada bajo condiciones de campo.

**FITOTOXICIDAD:**

MEGAPRID 200 SL no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se emplea bajo las condiciones indicadas en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



15.0 cm

2.17 cm

VERSION: 01-SS  
ULTIMA REVISION: 15-01-10

0002