

astrobín®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA

• Ingrediente activo:

Azoxystrobin..... 500 g/kg

• Aditivos 500 g/kg

Reg. PQUA N° 225 - SENASA

CONTENIDO NETO: 500 g

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**

Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.

Lima - Perú.

Teléfono: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:

KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED

4-A Building B, Yuanyang Building Jiaxing Zhejiang China.

Teléfono: 86 57382716483 / Fax: 86 57382716545

ENVASADO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**

Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial - Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**


DROKASA
P E R U

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “Este producto es nocivo si se ingiere”
- “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”
- “Evite contacto con la piel y la ropa”
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobirulinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas), ESSALUD Telf.: 423-7600 ó DROKASAPERÚ S.A. Telf.: 219-3901
- NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes o envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

ASTROBIN, es un fungicida translaminar y sistémico, con actividad preventiva, curativa y antiesporulante. Actúa inhibiendo la respiración mitocondrial en los hongos. Se mueve vía xilema (movimiento acropétalo) y tiene sistemicidad y movimiento translaminar, protegiendo completamente las hojas y brotes nuevos. **ASTROBIN** es usado para prevenir y controlar el ataque de *Peronospora destructor* en el cultivo de cebolla.

ASTROBIN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

ASTROBIN, es utilizado en forma preventiva cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o cuando se advierte los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta dos (02) aplicaciones / campaña / año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada sin protección hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante el periodo.

COMPATIBILIDAD

ASTROBIN, se puede combinar con fungicidas, insecticidas y biorreguladores, excepto con agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad. Sin embargo no debe ser usado en cultivos de manzano, porque produce fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/ha	g/200L	Kg/200L		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	250 - 300	125 - 150	-	2	0.05
Páprika	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	-	60 - 80	0.06 - 0.08	3	3

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

