

# astrobín®

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

**GRÁNULOS DISPERSABLES - WG**

### COMPOSICIÓN QUÍMICA

• Ingrediente activo:

Azoxystrobin..... 500 g/kg

• Aditivos ..... 500 g/kg

**Reg. PQUA N° 225 - SENASA**

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**  
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9, Magdalena del Mar  
Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:  
KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED  
4-A Building B, Yuanyang Building  
Jiaxing Zhejiang China.



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.**

**CONTENIDO NETO: 500 g**

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- “Este producto es nocivo si se ingiere”
- “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”
- “Evite contacto con la piel y la ropa”
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Estrobirulinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**  
**CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas), ESSALUD Telf.: 423-7600 ó DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 219-3901**
- **NOTA AL MÉDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes o envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200L		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.25 - 0.3	0.125 - 0.15	2	0.05
Páprika	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.06 - 0.08	3	3
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.10 - 0.12	14	15
Holantao	Oidiosis	<i>Erysiphe betae</i>	-	0.08 - 0.10	0	3
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.15 - 0.25	-	100	0.05
Café	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastratrix</i>	-	0.10 - 0.125	30	0.03

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

**INDICACIONES DE USO Y MANEJO**

**ASTROBIN**, es un fungicida translaminar y sistémico, con actividad preventiva, curativa y antiesporulante. Actúa inhibiendo la respiración mitocondrial en los hongos. Se mueve vía xilema (movimiento acropétalo) y tiene sistemicidad y movimiento translaminar, protegiendo completamente las hojas y brotes nuevos. **ASTROBIN** es usado para prevenir y controlar el ataque de *Peronospora destructor* en el cultivo de cebolla.

**ASTROBIN**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

**ASTROBIN**, es utilizado en forma preventiva cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o cuando se advierte los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta dos (02) aplicaciones / campaña / año como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada sin protección hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante el periodo.

**COMPATIBILIDAD**

**ASTROBIN**, se puede combinar con fungicidas, insecticidas y biorreguladores, excepto con agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad. Sin embargo no debe ser usado en cultivos de manzano, porque produce fitotoxicidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

