

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (máscara, guantes, botas y anteojos).
- Evitar el contacto con los ojos, piel y boca.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de la pulverización.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Dinitroanilina.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: No provocar vómitos, el disolvente puede provocar secuelas en las vías respiratorias. Mantener al afectado en un lugar tranquilo, abrigado y en reposo.
- No darle aceite de ricino, leche, ni aceites comestibles porque aceleran la absorción del producto.
- En caso de emergencia llamar gratis a **CICOTOX: 0800-1-3040** **ESSALUD: 117.**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

TANKE 40 EC

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición Química:

Pendimethalin 400 g/L
 Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 226 - SENASA

Titular del registro: Hortus S.A.
 Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú

Formulado y envasado por:



Almirante Pastene 300, Providencia
 Santiago Chile
 Teléfono: (56 2) 24706800
 Fax: (56 2) 24869100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú
 Telf.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
 RUC: 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 1 L
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TANKE 40 EC es un herbicida pre-emergente selectivo que es absorbido por las raíces y hojas de las malezas. Actúa inhibiendo la división celular, produciendo por tanto la inhibición del crecimiento de raíces y hojas. **TANKE 40 EC**, no presenta inconvenientes para su preparación y aplicación de acuerdo a las indicaciones siguientes: llenar el tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad de su capacidad, luego, poner el agitador en marcha y agregar la cantidad recomendada de **TANKE 40 EC**, finalmente completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo agitación constante para lograr una solución homogénea durante la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

Cultivo	M A L E Z A S		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Verdolaga Cerraja Moco de pavo Yuyo Ortiga Hierba mora Pega pega Lechera Hierba Santa Estelaria Cornelina Capuli cimarrón Lengua de vaca	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Urtica urens</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Euphorbia peplus</i> <i>Euphorbia hirta</i> <i>Stellaria media</i> <i>Commelina diffusa</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Rumex crispus</i>	2 - 4	Solo se aplicará en el transplante o siembra del cultivo	0.1
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Verdolaga Yuyo Paico Arrocillo o caminadora Capuli cimarrón Pata de gallina Rabo de zorro	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Chenopodium album</i> <i>Rottboellia cochinchinensis</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria parviflora</i>	2.5 - 3	Solo se aplicará en el transplante o siembra del cultivo	0.1
Caña de azúcar	Higuierilla Lechera Paico Pata de Gallina Portulaca Rabo de zorra Yuyo Papa Cora	<i>Ricinus communis</i> <i>Euphorbia peplus</i> <i>Chenopodium album</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Setaria parviflora</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Pitreaa cuneata - ovata</i>	2.5 - 3	30	0.1

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

PC: Periodo de carencia en días

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **TANKE 40 EC** en un suelo mullido, húmedo, en capacidad de campo y libre de malezas. Debe aplicarse únicamente después de la siembra o después del transplante del cultivo. Realizar 1 aplicación/campaña/año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD: **TANKE 40 EC** es incompatible con productos de reacción fuertemente ácida o alcalina. En caso de mezcla con otros productos deben realizarse pruebas de compatibilidad en pequeña escala.

FITOTOXICIDAD: **TANKE 40 EC** puede ser fitotóxico si es aplicado es suelos superficiales o, livianos o en caso que penetre hasta los sectores de la semilla del cultivo en germinación. Puede causar fitotoxicidad si no se prepara adecuadamente la cama de semilla.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

