Pamphlet

160 mm

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo químico: Carbodiamidas
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y jabón.
-No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
-Nota al médico: se recomienda usar absorbentes como carbón activado. Puede generar cianuro de hidrógeno, en caso de observar sintomatología, administrar nitrito de amilo u otro antídoto específico disponible.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
INFOSALUD: 113
RAINBOW AGROSCIENCES: (01)- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-Tóxico para abejas. - Para abejas tóxico por contacto.
-No aplicar en época de floración del cultivo.
-Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
-Tóxico para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INYECTOR® 50%SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Hydrogen cyanamide ..... 500 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

RCP N° 005 -SENASA

Nombre IUPAC: Cyanamide
Fórmula empírica: CH_2N_2
Fórmula estructural:

N° CAS: 420-04-2
Peso molecular: 42.040 g/mol
Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguna
Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 1, 5 y 20 L.

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (01)- 678-9544

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.
Binhai Economic Development Area Weifang,
Shandong 262737, China.
Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU SAC
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima – Perú
Teléfono: +51 992 763 127

CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Cultivo	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	L/200L	L/Ha		
Vid	5	10	N.R.	0.01
Arándano	5	15*	N.R.	0.01

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos.
N.R.: No requiere. *Gasto de agua: 600L

MODO DE ACCIÓN: INYECTOR® 50% SL es un regulador de crecimiento de plantas que promueve la ruptura de yemas, destinado para ser usado en el cultivo de vid y arándano, cultivos que necesitan horas de frío para tener una adecuada producción.

MECANISMO DE ACCIÓN: La cianamida hidrogenada provoca fuerte inhibición de catalasa y citocromoxidasa y los tioles bloqueados de los sistemas redox.

COMPATIBILIDAD
No mezclar con fertilizantes foliares, herbicidas ni con otros plaguicidas, siendo compatible con surfactantes no iónicos.

PERIODO DE REINGRESO
Posterior a las 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
En vid, aplicar durante la etapa de agoste del cultivo, las aplicaciones deben ser dirigidas sobre los sarmientos o ramas con yema productivas. Efectuar una aplicación por campaña agrícola. Efectuar una aplicación por campaña agrícola.
Para el caso de arándanos aplicar posterior a la poda del cultivo y realizar una aplicación por campaña considerando una campaña al año.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre hojas y ramas, y directamente sobre los cargadores para el caso de vid. Utilizar equipo de aspersión manual.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

300 mm