

14.0 cm

19.0 cm

LARVIX®

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Methomyl..... 900 g/kg
Aditivos..... c.s.p 1 kg

Reg. PQUA N° 229 - SENASA

“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular de Registro:

Comercial Andina
Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Fabricado y Formulado por:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd.
6th Floor, Gaoxinjishuquangye Centre, Shunhua Road 750, Jinan, Shandong, China.
Telf.: + 86-531-88875230, 88875231, 88875227
Fax: +86 - 531 - 88875232, 88875224

Importado y Distribuido por:

GRUPO
ANDEX S.A.C.

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Cont. Neto: 100 gr.
(bolsa soluble en agua)

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Altamente peligroso por inhalación.
- Altamente irritante al tracto respiratorio.
- Causa irritación moderada a los ojos e irritación ligera a la piel.
- No debe almacenarse cerca o próximo a casa vivienda. Lave con abundante agua el envase vacío y elimínelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No transfiera el producto a otros envases para almacenamiento.
- Almacene en un lugar seco y cerrado bajo llave.
- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal o dañino si entra en contacto con la piel, los ojos o si se aspira el polvo.
- Para manipular el producto, usar ropa con manga larga, guantes, mascarara y anteojos protectores, lavarse las manos y cara antes de fumar o comer.
- Al final de trabajo de cada día debe bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse con ropa limpia. La ropa contaminada debe ser lavada profundamente antes de volver a usarla.
- No reingresar al área tratada sin equipo de aplicación durante las primeras 48 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: CARBAMATOS

Llamar inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase. En el caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón y enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos. Llevar al paciente al Médico. En el caso de ingestión beber 1 o 2 vasos de agua e inducir vómitos tocando la garganta con los dedos. No hacer esta operación cuando el paciente está inconsciente. Llevar inmediatamente el paciente al médico.

NOTA AL MEDICO: ADMINISTRAR SULFATO DE ATROPINA INTRAVENOSO O INTRAMUSCULAR.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX 0-800 - 1- 3040
CAISAC (01) 271 - 3366

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LARVIX® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad sistémica y bajo poder residual en la planta.

LARVIX® es envasado en bolsas plásticas hidrosolubles de 100 g, para evitar que el operario tenga contacto directo con el producto (via dermal o inhalatoria) durante la preparación de la mezcla. Diluir las bolsas hidrosolubles en una cantidad parcial de agua, agitar bien y luego añadir mas agua hasta completar el volumen final, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

LARVIX® se aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre (mochilas a palanca o motor y otros) utilizando boquillas de cono hueco o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observarse las primeras larvas y huevos. Realizar un máximo de 1 aplicación/campaña usar un volumen de agua de 400 l/ha.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de la aplicación del plaguicida.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con aguas o productos alcalinos, puesto que, pueden generar la hidrólisis del ingrediente activo. En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda hacer una prueba previa.

FITOTOXICIDAD

LARVIX® se considera un insecticida tolerado por plantas, sin embargo se recomienda aplicar pequeñas cantidades en un numero limitado de plantas, antes de proceder a su uso en gran escala.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa o maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg /200 L	Kg /Ha		
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	--	7	0.02
Brócoli	Polilla del dorso diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.2	0.42	3	0.02
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	0.4	7	0.2
Espárrago	Caballada (Gusano ejército)	<i>Spodoptera eridania</i>	--	0.5	1	2
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	--	0.5 - 0.7	3	0.02
Palto	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2-0.25	--	n.d.	0.02
Pimiento	Caballada (Gusano ejército)	<i>Spodoptera eridania</i>	--	0.38	1	0.7

PC: Periodo de Carenia.

n.d: No determinado

LMR: Límite Máximo de Residuos.

