

LARVIX[®]

INSECTICIDA AGRICOLA

Polvo Soluble (SP)

Composición Química:

Methomyl 900 g/kg
Aditivos 100 g/kg

“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”
Reg. PQUA N° 229 - SENASA

Contenido Neto: **1 kg**

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.

Titular de Registro: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC
Calle El Galeón 180 Urb La Calessa Surco - Lima
Tel.: (01) 271 - 3366 Fax: (01) 271 - 1988
Correo Electronico: atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Fabricado y Formulado: POINT INTERNATIONAL LTD.
Great Rollright, Chipping Norton, Gran Bretaña
Tel.: (44)1608 730191 Fax: (44) 1608737715

Importado y distribuido por: GRUPO ANDEX SAC
Calle El Galeón 180 Urb La Calessa Surco - Lima
Tel.: (01) 271 - 3366 Fax: (01) 271 - 1988
Correo Electronico: atencionalcliente@grupoandina.com.pe

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Altamente peligroso por inhalación
- Altamente irritante al tracto respiratorio.
- Causa irritación moderada a los ojos e irritación ligera a la piel.
- No debe almacenarse cerca o próximo a casa vivienda. Lave con abundante agua el envase vacío y elimínelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No transfiera el producto a otros envases para almacenamiento.
- Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.
- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal o dañino si entra en contacto con la piel, los ojos o si se aspira el polvo.
- Para manipular el producto, usar ropa con manga larga, guantes, máscara y anteojos protectores, lavarse las manos y cara antes de fumar o comer.
- Al final de trabajo de cada día debe bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse con ropa limpia. La ropa contaminada debe ser lavada profundamente antes de volver a usarla.
- No reingresar al área tratada sin equipo de aplicación durante las primeras 48 horas.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.



LARVIX[®]

INSECTICIDA AGRICOLA

Polvo Soluble (SP)

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO

LARVIX[®] es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad sistémica y bajo poder residual en la planta.
LARVIX[®] es envasado en bolsas plásticas hidrosolubles de 100 g. para evitar que el operario tenga contacto directo con el producto (vía dermal o inhalatoria) durante la preparación de la mezcla. Diluir las bolsas hidrosolubles en una cantidad parcial de agua, agitar bien y luego añadir más agua hasta completar el volumen final, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
LARVIX[®] se aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) utilizando boquillas de cono hueco o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con aguas o productos alcalinos, puesto que, pueden generar la hidrólisis del ingrediente activo.
En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda hacer una prueba previa.

FITOTOXICIDAD

LARVIX[®] se considera un insecticida tolerado por plantas, sin embargo se recomienda aplicar pequeñas cantidades en un número limitado de plantas, antes de proceder a su uso en gran escala.

Frecuencia y Época de aplicación

Aplicar al observarse las primeras larvas y huevos.
Realizar un máximo de 1 aplicación/campaña
Volumen (gasto) de aplicación: 400 l/ha

Periodo de reingreso

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de la aplicación del plaguicida.

Responsabilidad Civil

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg /Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.5 - 0.7	3	0.02
Esparrago	Gusano de Tierra	<i>Spodoptera eridania</i>	0.5	1	2

PC: Periodo de Carenacia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUIMICO: CARBAMATOS

Llamar inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

En el caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón y enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos. Llevar el paciente al Médico.

En el caso de ingestión beber 1 o 2 vasos de agua e inducir vomitos tocando la garganta con los dedos. No hacer esta operación cuando el paciente está inconsciente. Llevar inmediatamente el paciente al médico.

NOTA AL MEDICO:
ADMINISTRAR SUFALTO DE ATROPINA INTRAVENOSO O INTRAMUSCULAR

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800 - 1- 3040
CAISAC (01) 271 - 3366

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y COMSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

