



ETIQUETA

Larvix - CAISAC

Revisión: 001
Aprobado:
Fecha: 22/03/2024
Página: 3 - 3

INSECTICIDA AGRICOLA
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
POLVO SOLUBLE (SP)

Larvix®
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRICOLA
POLVO SOLUBLE (SP)

Composición
Methomyl (S-methyl- N-[(methyl-carbamoyl)oxy] thio-acetimidate) 900 g/kg
Aditivos c.s.p 1 kg

Reg. PQUA Nº 229 - SENASA
“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular de Registro, Importado
y Distribuido por:
**Comercial Andina
Industrial S.A.C.**
Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Fabricado y Formulado por:
POINT INTERNATIONAL LTD.
Great Rollright, Chipping Norton, Gran Bretaña
Telf.: (44)1608 730191 Fax: (44) 1608737715

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Altamente peligroso por inhalación.
• Altamente irritante al tracto respiratorio.
• Causa irritación moderada a los ojos e irritación ligera a la piel.
• No debe almacenarse cerca o próximo a casa vivienda. Lave con abundante agua el envase vacío y elimínelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
• No transfiera el producto a otros envases para almacenamiento.
• Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.
• Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal o dañino si entra en contacto con la piel, los ojos o si se aspira el polvo.
• Para manipular el producto, usar ropa con manga larga, guantes, mascara y anteojos protectores, lavarse las manos y cara antes de fumar o comer.
• Al final de trabajo de cada día debe bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse con ropa limpia. La ropa contaminada debe ser lavada profundamente antes de volver a usarla.
• No reingresar al área tratada sin equipo de aplicación durante las primeras 48 horas.

PRIMEROS AUXILIOS
• **GRUPO QUÍMICO: CARBAMATOS**
• Llamar inmediatamente al medico y mostrarle la etiqueta o el envase.
• En el caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón y enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos. Llevar el paciente al Médico.
• En el caso de ingestión beber 1 o 2 vasos de agua e inducir vómitos tocando la garganta con los dedos. No hacer esta operación cuando el paciente está inconsciente. Llevar inmediatamente el paciente al medico.

NOTA AL MEDICO: ADMINISTRAR SULFATO DE ATROPINA INTRAVENOSO O INTRAMUSCULAR. TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX 0-800 - 1- 3040 CAISAC (01) 255-2830

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
• Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
• Peligroso para organismos acuáticos.
• No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacíos.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
• Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Larvix®
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRICOLA
POLVO SOLUBLE (SP)

Composición
Methomyl (S-methyl- N-[(methyl-carbamoyl)oxy] thio-acetimidate) 900 g/kg
Aditivos c.s.p 1 kg

Reg. PQUA Nº 229 - SENASA
“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular de Registro, Importado
y Distribuido por:
**Comercial Andina
Industrial S.A.C.**
Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Fabricado y Formulado por:
POINT INTERNATIONAL LTD.
Great Rollright, Chipping Norton, Gran Bretaña
Telf.: (44)1608 730191 Fax: (44) 1608737715

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
LARVIX® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad sistémica y bajo poder residual en la planta.
LARVIX® es envasado en bolsas plásticas hidrosolubles de 100 g. para evitar que el operario tenga contacto directo con el producto (vía dermal o inhalatoria) durante la preparación de la mezcla. Diluir las bolsas hidrosolubles en una cantidad parcial de agua, agitar bien y luego añadir mas agua hasta completar el volumen final, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
LARVIX® se aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre (mochilas a palanca o motor y otros) utilizando boquillas de cono hueco o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar al observarse las primeras larvas y huevos. Realizar un máximo de 1 aplicación/- campaña usar un volumen de agua de 400 l/ha.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de la aplicación del plaguicida.

COMPATIBILIDAD
No mezclar con aguas o productos alcalinos, puesto que, pueden generar la hidrólisis del ingrediente activo. En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda hacer una prueba previa.

FITOTOXICIDAD
LARVIX® se considera un insecticida tolerado por plantas, sin embargo se recomienda aplicar pequeñas cantidades en un número limitado de plantas, antes de proceder a su uso en gran escala.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa o maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”						
CUADRO DE USOS						
CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg /200 L	kg /ha		
Aicachofa	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	0,2	--	7	0,02
Brócoli	Pollita del dorso diamante	Plutella xylostella	0,2	0,42	3	0,02
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0,2	0,4	7	0,2
Espárrago	Caballada (Gusano ejército)	Spodoptera eridania	--	0,5	1	2
Maíz	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	--	0,5 - 0,7	3	0,02
Pimiento	Caballada (Gusano ejército)	Spodoptera eridania	--	0,38	1	0,7
Pato	Thrips	Thrips tabaci	0,2-0,25	--	n.d.	0,02
PC: Periodo de Carenia.			n.d: No determinado		LMR: Límite Máximo de Residuos.	

